

قُسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

1 - 2: مجال الدالة

جزء 1: العلاقة والدالة.

جزء 2: مجال الدالة.

2 - 2: الدوال التربيعية ونمذجتها

جزء 1: الدوال التربيعية.

جزء 2: نمذجة البيانات.

3 - 2: الدوال التربيعية والقطوع المكافئة

جزء 1: القطوع المكافئة التي تمثل دوال تربيعية.

جزء 2: معادلات بعض القطوع المكافئة بدلالة إحداثيات رؤوسها وخواصها.

4 - 2: مقارنة بين صورة معادلة الدالة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة

5 - 2: المعكوسات ودوال الجذر التربيعي

جزء 1: معكوس العلاقة ومعكوس الدالة الخطية.

جزء 2: دوال الجذر التربيعي.

6 - 2: حل المتباينات

مقدمة الوحدة

الوحدة الثانية

الدوال الحقيقية

The Real Functions

مشروع الوحدة: رياضة القوس والشاب

- 1 مقدمة المشروع: نستعمل رياضة القوس والشاب سلاحاً على شكل قوس وأدوات رمادية وهي الأسهم. يصبوب فيها اللاعب على قرص كبير مقسم إلى خمس حلقات مختلفة الألوان بترتيب محدد من الداخل إلى الخارج: أصفر، أحمر، أزرق، أسود وأخيراً أبيض ولكل حلقة عدد من النقاط غير المتساوية تتدرج من 1 إلى 10 بحسب قربها أو بعدها عن المركز. فعلاً إذا سقط السهم على الحلقة البيضاء بنال الرامي نقطة واحدة (1) أما إذا سقط السهم على الحلقة الصفراء فينال الرامي 10 نقاط.
- 2 الهدف: خلال عملك في هذه الوحدة سوف تبحث في مواضيع مثل: كيف يختار الرامي أسهمه؟ وكيف غيرت التكنولوجيا في هذه الرياضة؟ وقد تحتاج في نهاية المشروع إلى تقديم عرض لما توصلت إليه.
- 3 اللوازم: السهم: قطره الأقصى 9.3 mm القوس: يختلف وزنه بين الإناث والرجال، أوراق رسم بياني، آلة حاسبة، أوراق ملصقات.
- 4 أسئلة حول التطبيق:
- 5 يرسم الطلاب القطع المكافئ الذي يمكن أن يمثل مسار السهم عندما يطلقه الرامي أثناء وقوفه أو أثناء جلوسه على كرسي متحرك.
- 6 يمكن تنفيذ عدة رسوم لمسارات عدد من الأسهم، ثم تحديد التشابهات والاختلاف بينها. يوضح الجدول أدناه كيف أن وزن السهم يؤثر على محوره المركزي. ارسم البيانات المعطاة في الجدول على شبكة إحداثيات. هل حصلت على نموذج خطي أم على نموذج تربيعي؟



الوزن بالجرام (g)	140	150	170	175	205
المحور المركزي بالسنتيمتر (cm)	3.6	3.2	2.4	2	1.1

- 7 افترض أنك أحد الرماة وصوتت سهمًا وأنت واقفاً قس المسافة من الأرض إلى كتفك. افترض أنك قد أصبت هدفاً على ارتفاع 5 m عن سطح الأرض. ارسم بيانياً الشكل الممثل لمسار سهمك مستخدماً هذه البيانات. حدد هذا الشكل.
- 8 أجر مقابلة مع أحد رماة القوس والشاب في نادي الرماية الكويتي. ابحث عن بعض تقنيات هذه اللعبة وتطورها وشروط تطبيقها.
- 9 التقرير: قدم تقريراً مفصلاً عن أبحاثك ورسومك عارضاً إيجابيات هذه اللعبة من حيث الدقة والتركيز والميزات الأساسية للاعب. قدم مشروعك بعض بصري أو مسرحي قصير أو على قرص مدمج.

دروس الوحدة

مجال الدالة	الدوال التربيعية ونماذجها	الدوال التربيعية ومقارنتها بين صورة المعادلة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة	المحركات ودوال المنحدر التربيعي	حل المعادلات
2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
2-6				

42

يتمحور محتوى هذه الوحدة حول جزء من الدوال الحقيقية، حيث سيكون التركيز على مجال التعريف ببعض الدوال الحقيقية بمداها، وبصورة خاصة بالدوال التربيعية ورسومها البيانية لذا سنتوقف لدراسة القطع المكافئ والتعرف على بعض خصائصه.

أوضح جاليليو أن جميع المقذوفات تأخذ مساراً منتظماً على شكل قطع مكافئ (N)، وهذا يعود إلى انتظام عجلة الجاذبية للأرض. كما أن للقطوع المكافئة تطبيقات حياتية متنوعة في مرايا السيارات، ومصابيحها الأمامية، وفي الصواريخ الباليستية، وفي تركيز الإنارة والصوت في الملاعب، وفي التليسكوبات العاكسة، وأطباق الأقمار الاصطناعية، وفي أجهزة الرادارات. وسوف يرى الطالب في مرحلة لاحقة عدة معادلات للقطع المكافئ تجعل رسمه البياني مفتوحاً نحو أحد الاتجاهات المعروفة، وباختصار فإن أي دالة في x ، على أن تكون كثيرة حدود من الدرجة الثانية، نحصل منها على رسم بياني هو قطع مكافئ.

وبصورة عامة، فإن القطع المكافئ هو منحنى يعرف بالمعادلة غير القابلة للاختزال كما يلي:

$$b^2 = 4ac, \text{ حيث } ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$


والمعروف، أن دالة القطع المكافئ أو الدالة التربيعية قد ساهمت كثيراً في إيجاد حلول لمسائل اقتصادية ومالية وحياتية تتطلب تحقيق قيم عظمى أو قيم صغرى.

مسألة للتفكير

ABC مثلث قائم الزاوية \hat{A} .

$$AB = 8 \text{ cm}, AC = 6 \text{ cm}$$

D نقطة متحركة على AC ، بحيث إن $AD = x (0 < x < 6)$ ، $AFED$ مستطيل.



(a) أثبت أن مساحة المستطيل هي دالة تربيعية $f(x)$ ،

$$\text{بحيث إن: } f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 8x$$

(b) أكمل الجدول التالي:

$x \text{ (cm)}$									
$f(x) \text{ cm}^2$									

(c) ما قيمة x التي تحقق قيمة عظمى للدالة $f(x)$ ؟

وما أبعاد المستطيل إذا ما تحققت المساحة العظمى؟

مشروع الوحدة

حفّز الطلاب على إجراء بحث واسع ومستفيض عن رياضة القوس والنشاب ليتعرفوا أكثر على شروطها وكيفية التعامل معها. أخبرهم أن هذه الرياضة تتطلب تركيزاً وأعصاباً قوية وهادئة ودقة في التصويب.

شجعهم على تجميع نتائج مباريات القوس والنشاب التي جرت في دورات الأولمبياد العالمية.

اطلب إليهم تكوين جداول مشابهة للجدول الموجود في مشروع الوحدة، ثم كتابة دالة تربيعية باستخدام ثلاث قيم. ركّز معهم على فكرة أن الرسم البياني لن يمر بالنقاط كلها الموجودة على الجدول بل إن معظمها سيكون قريباً منه.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

- تحقق من عمل الطلاب.
- نموذج تربيعي.
- تحقق من عمل الطلاب.
- تحقق من عمل الطلاب.

التقرير

اكتب تقريراً يبيّن أهمية التركيز في استخدام القوس والنشاب. اعرض رسومك البيانية وحساباتك أمام زملائك في غرفة الصف، وناقشهم بالنتائج التي توصلت إليها، ثم أعد النظر ببعضها إذا كان ذلك ضرورياً.

الوحدة الثانية

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- تعرفت العمليات الأساسية على التعابير الجذرية
- تعرفت قوانين الأسس وكيفية استخدامها في تبسيط الجذور.
- تعلمت كيفية إيجاد حلول لمعادلات جذرية ومعادلات أسية.
- تعرفت نموذجاً موافقاً حياتياً إلى دوال خطية ومعادلات تربيعية.
- تعلمت إيجاد حلول معادلة من الدرجة الثانية بطرق متعددة.

ماذا سوف تتعلم؟

- الدوال التربيعية واستخداماتها.
- نموذج البيانات.
- إيجاد أوسع مجال للدوال الجذرية والنسبية والجذرية.
- إيجاد القيم الصغرى والقيم العظمى لدالة تربيعية.
- رسم القطع المكافئ بدلالة إحداثيات رأسه.
- إيجاد رأس منحني الدالة من الدالة المكونة في الصورة العامة.
- كتابة المعادلات التربيعية بدلالة إحداثيات الرأس وفي الصورة العامة.
- إيجاد معكوس الدوال الخطية والدوال التربيعية.
- استخدام دوال الجذر التربيعي لتبسيط مواقف حياتية.
- حل متباينات تتضمن حدوديات من الدرجة الثانية في متغير واحد أو حدوديات نسبية.

المصطلحات الأساسية

دالة تربيعية – نموذج بيانات – مجال – مدى – قيمة صغرى – قيمة عظمى – قطع مكافئ – رأس القطع المكافئ – الصورة العامة – معادلة بدلالة إحداثيات رأس القطع المكافئ – معكوس دالة خطية – معكوس دالة تربيعية – متباينة من الدرجة الثانية – متباينة حدوديات نسبية.

أخف إلى معلوماتك

ارتبطت رياضة الرماية منذ بداياتها الأولى بالقوة إذ بدأت كسلاح ثم تطورت ليصبح رياضة للنخبة.

حت الإسلام المسلمين على ممارسة هذه الرياضة وجعلها في مصاف الفروسية والسباحة حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب قال: «علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الحيل». وبقيت هذه الهواية مصداً للحرياء العرب وسلاحاً للدفاع عن أنفسهم.

ومن المتعلّق ف عليه أن الرماية بالقوس والسهم تتطلب توازناً وقدرة فائقة على التركيز تحت ضغط كبير وقوة متميزة في جذب الزر والطلاق السهم وذلك بسرعة تصل إلى 240 km/h تقريباً.



لقد تمكن المنتخب الوطني الكويتي لرماية القوس والسهم من الحصول على 8 ميداليات متنوعة في البطولة العربية الثامنة لرماية القوس والسهم والتي أقيمت في مدينة «سرت» الليبية لذا وضعت إدارة نادي الرماية الكويتي برامج هادفة لاستقطاب الشباب الكويتي على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في ممارسة هذه الرياضة وقررت تجهيز ميدان متكامل وتوفير أحدث الأجهزة من القواس وأسهم ومعدات للرماية.

سّلم التقييم

4	الرسومات دقيقة – الحسابات صحيحة – تقديم المشروع جيد جداً – التقرير مفصل وواضح.
3	معظم الرسومات دقيقة – أخطاء قليلة في الحسابات – تقديم المشروع جيد – معظم التقرير مفصل وواضح.
2	بعض الرسومات دقيقة – أخطاء متعددة في الحسابات – تقديم المشروع مقبول – نقاط كثيرة في التقرير غامضة.
1	معظم عناصر المشروع غير كاملة.

2-1: مجال الدالة

1 الأهداف

- يتعرف متى تمثل العلاقة دالة.
- يتعرف مجال الدالة.

2 المفردات والمفاهيم الجديدة

العلاقة – المجال – المجال المقابل – المدى – الدالة – اختبار المستقيم الرأسى – أصفار المقام.

3 الأدوات والوسائل

جهاز إسقاط (Data show) – حاسوب.

4 التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

(a) حل كل معادلة مما يلي:

$$(1) 2x - 5 = 0$$

$$(2) x^2 - 9 = 0$$

$$(3) x^2 - 7x + 12 = 0$$

(b) حل كل متبينة مما يلي:

$$(1) 3x - 12 \geq 0$$

$$(2) -4x + 8 \geq 0$$

(c) أوجد قيم المتغير x حيث يكون الجذر التربيعي معرفاً.

$$(1) \sqrt{3x - 6}$$

$$(2) \sqrt{-2x + 5}$$

(d) أوجد قيم المتغير x حيث يكون الجذر التكعيبي معرفاً.

$$(1) \sqrt[3]{x - 5}$$

$$(2) \sqrt[3]{-3x + 4}$$

(e) أوجد مجموعة حل النظام التالي:


$$\begin{cases} 3x - 6 \geq 0 \\ -2x + 10 \geq 0 \end{cases}$$

5 التدريس

يعتبر تعريف مجال الدالة، ومجالها المقابل، ومداها من الشروط الأساسية لدراسة الدالة وخصائصها وميزاتها. وهذا يشابه كثيراً تركيز الأساس عند بناء البيوت والقلاع والأبراج.

مجال الدالة

Domain of the Function



دعنا نفكر ونتناقش

من أهم ما يميز حياة الإنسان العلاقات. مثل انتماء شخص إلى وطنه أو إلى نادي رياضي أو ثقافي أو انتماء نقطة إلى منحنى. يمكن تمثيل العلاقات أحياناً بمخططات سهمية.

- اختر خمسة من أصدقائك، واكتب أسمائهم ثم صل كل اسم بسنة ولادته.
- أعد كتابة الأسماء الخمسة واكتب أسماء ثلاث رياضات ثم صل كل شخص برياضته المفضلة.

في الفقرة (a) يرتبط كل اسم بسنة ولادته بينما في الفقرة (b) قد يرتبط الاسم الواحد بأكثر من رياضة أو قد لا يرتبط بأي رياضة. قارن بين عملك وعمل زملائك في الفصل.

سوف نتعرف في هذا الدرس على العلاقات ونمثلها بيانياً، وسوف نتعرف أيضاً متى تمثل العلاقة دالة مع التركيز على العلاقات في المستوى الإحداثي.

Relation and Function

العلاقة والدالة

كثيراً ما نحتاج في الرياضيات وتطبيقاتها إلى التعبير عددياً أو جبرياً عن علاقة تربط بين متغيرين أو أكثر، والعلاقة رياضياً هي أي مجموعة من الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي، وتسمى مجموعة المساقط الأولى لهذه الأزواج (الإحداثيات الأفقية أي السينية) **مجال العلاقة** وتسمى مجموعة المساقط الثانية (الإحداثيات الرأسية أي الصادية) **مدى العلاقة** وهي مجموعة جزئية من المجال المقابل.


عندما يكون كل عنصر (عدد) في المجال مرتبطاً بعنصر (عدد) واحد فقط من المجال المقابل، فإن العلاقة تسمى دالة.

والدالة التي مجالها ومجالها المقابل مجموعتان جزئيتان من الأعداد الحقيقية تسمى دالة حقيقية.

مثال توضيحي (1)

في المخططات السهمية التالية علاقات من: $X \rightarrow Y$

- حدد المجال والمجال المقابل والمدى.
- اكتب كل علاقة على شكل مجموعة من الأزواج المرتبة.
- بين أي من العلاقات يمثل دالة حقيقية وأيها لا يمثل دالة حقيقية مع ذكر السبب.



الحل:

(a) المجال = {1, 2, 3, 4, 6}

المجال المقابل = {1, 2, 3, 4, 5}

المدى = {2, 3, 4, 5}

(2) العلاقة: $r_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$

(3) العلاقة r_1 لا تمثل دالة لأن العنصر 6 من المجال لم يقترن بعنصر من المجال المقابل.

(b) المجال = {1, 2, 3, 4, 5}

المجال المقابل = {0, 1, 2, 3}

المدى = {2}

(2) العلاقة: $r_2 = \{(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2)\}$

(3) العلاقة r_2 تمثل دالة حقيقية لأن كل عنصر من المجال يقترن بعنصر واحد فقط من المجال المقابل.

(c) المجال = {1, 2, 3, 4, 5}

المجال المقابل = {1, 4, 9, 16, 25}

المدى = {1, 4, 9, 16, 25}

(2) العلاقة: $r_3 = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)\}$

(3) العلاقة r_3 تمثل دالة حقيقية لأن كل عنصر من المجال يقترن بعنصر واحد فقط من المجال المقابل.

(d) المجال = {1, 2, 3, 4}

المجال المقابل = {2, 3, 4}

المدى = {2, 3, 4}

في المثال التوضيحي (1) سوف يوضح الفرق بين العلاقة والدالة، حيث تساعد المخططات السهمية كثيرًا على إبراز هذا الفرق، وتوفر للطلاب فرصة للتعرف على مجال العلاقة (الدالة) أو المجموعة الابتدائية أو مجموعة الانطلاق ثم المجال المقابل أو مجموعة الوصول وبعد ذلك المدى وهو الجزء من المجال المقابل.

في المثال (1)

يساعد كثيرًا اختبار المستقيم الرأسي على تحديد ما إذا كان بيان علاقة ما يمثل دالة أم لا. قدّم للطلاب أمثلة بيانية متعددة عن المستقيم ليلاحظوا أن التقاطع بين المستقيم الرأسي وبيان العلاقة يجب أن يكون على الأكثر نقطة واحدة كي يكون هذا البيان لدالة.

في المثال التوضيحي (2) والمثال (2)

يعالجان معًا مجال دوال من أنواع متعددة سوف تكون ركائز للطلاب خلال دراسته المستقبلية إن كان لجهة الدوال الحدودية أو النسبية، أو لجهة الدوال الجذرية (تربيعية أو تكعيبية أو ...). ناقش معهم بشكل خاص حلول الأمثلة التالية:


مثال توضيحي (2) (d-f) ثم مثال (2) (c-d) حيث إن المقام يجب أن لا يساوي صفرًا.

6 الربط

نأخذ المثلث ABC قائم الزاوية A ، حيث: $AC = 7$, $AB = 24$.
نأخذ على \overline{AB} نقطة D بحيث $AD = x$.
نكمل المستطيل $ADEF$.

أوجد مساحة $ADEF$ بدلالة x ، حدّد مجال هذه المساحة $f(x)$.

الحل: $ED = \frac{7}{24}(24 - x)$, $AD = FE = x$
وبالتالي: $f(x) = \frac{-7}{24}x^2 + 7x$
مجال هذه الدالة: $0 < x < 24$



7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في تحديد الشروط لتعريف مجال الدالة النسبية (الدالة الكسرية) التي تتضمن جذورًا في البسط أو في المقام، ومن ثم إيجاد حلول لنظام متباينات. اعرض أمثلة متعددة تساعد الطلاب على تخطي هذه الأخطاء.


- العلاقة: $r_4 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)\}$
العلاقة r_4 لا تمثل دالة حقيقية لأن العنصر 3 من المجال يقترن بعنصرين من المجال المقابل.

إذا كانت العلاقة ممثلة بيانيًا في المستوى الإحداثي، نستخدم في هذه الحالة اختبار المستقيم الرأسي (المودي) لمعرفة ما إذا كانت العلاقة تمثل دالة أم لا.

اختبار المستقيم الرأسي:
إذا تقاطع كل مستقيم رأسي مع بيان علاقة ما بنقطة واحدة على الأكثر، فإن هذه العلاقة تكون دالة.

مثال (1)

استخدم اختبار المستقيم الرأسي لتحديد ما إذا كان بيان كل علاقة مما يلي يمثل دالة أم لا:




الحل:

- a) يمكن رسم على الأقل مستقيم رأسي واحد يقطع المنحنى بأكثر من نقطة واحدة. ∴ البيان لا يمثل دالة.
b) كل مستقيم رأسي يقطع المنحنى بنقطة واحدة على الأكثر. ∴ البيان يمثل دالة.
c) كل مستقيم رأسي يقطع المنحنى بنقطة واحدة. ∴ البيان يمثل دالة.

حاول أن تحل

1. استخدم اختبار المستقيم الرأسي لتحديد ما إذا كان بيان كل علاقة مما يلي يمثل دالة أم لا:



46

Domain of the function

مجال الدالة

إذا كانت لدينا دالة: $y = f(x)$ ، فإن مجالها هو مجموعة كل الأعداد الحقيقية التي يأخذها المتغير x ولتكن D هذه المجموعة، وينتج عنها قيم حقيقية للمتغير y ونقول أن الدالة معرفة على المجال D .

مثال توضيحي (2)

حدّد مجال كل من الدوال التالية:

- a) $f(x) = 2x + 1$
b) $g(x) = x^2 + 3x + 1$
c) $t(x) = \sqrt{3x - 4}$
d) $h(x) = \frac{x + 2}{x - 4}$
e) $u(x) = \sqrt[3]{2x + 1}$
f) $v(x) = \frac{\sqrt{3x - 4}}{x - 2}$

الحل:

- a) الدالة f كثيرة حدود وبالتالي أي قيمة حقيقية يأخذها المتغير x ينتج عنها قيمة حقيقية للمتغير y ومنه نجد أن مجال الدالة f هو مجموعة الأعداد الحقيقية R .
b) الدالة g كثيرة حدود وكما هو في a) نجد أن مجال الدالة g هو R .
c) من المعروف أنه لا يوجد للعدد السالب جذر تربيعي في مجموعة الأعداد الحقيقية R وعليه يكون مجال الدالة t هو مجموعة قيم x الحقيقية والتي تجعل المجدور عددًا موجبًا أو صفرًا. لذا نكتب:

$$3x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{4}{3}$$

$$x \in \left[\frac{4}{3}, \infty\right)$$

أي أن مجال t هو $\left[\frac{4}{3}, \infty\right)$

نفرض أن: $h(x) = \frac{h(x)}{d(x)}$

الدالة h دالة نسبية (حدودية نسبية) حيث البسط هو دالة كثيرة حدود مجالها R والمقام d دالة كثيرة حدود مجالها R .

لإيجاد أصغار المقام نكتب:

$$d(x) = 0$$

كالتالي:

$$x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$$

فيكون مجال الدالة h مجموعة الأعداد الحقيقية R باستثناء العدد 4.

$$R \setminus \{4\} = (4, \infty) \cup (-\infty, 4)$$

إذ الجذر التكعيبي لأي عدد معرف في مجموعة الأعداد الحقيقية R ومنها الجذر التكعيبي لأي دالة كثيرة الحدود يكون معرفًا على مجموعة الأعداد الحقيقية R .

∴ مجال الدالة u هو R .

$$v(x) = \frac{h(x)}{d(x)}$$

الدالة v دالة نسبية حيث البسط هو دالة كثيرة حدود مجالها R والمقام d دالة كثيرة حدود مجالها R .

معلومة رياضية:

(4) - يمكن أن نكتب بالصورة $R \setminus \{4\}$.

راقب الطلاب وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل».
للتأكد من حسن أدائهم في معالجة تعريف مجال الدالة.

اختبار سريع

حدّد مجال كل دالة مما يلي:

(a) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5$

كثيرة حدود مجالها \mathbb{R}

(b) $f(x) = \sqrt{-4x + 7}$

مجالها: $[-\infty, \frac{7}{4}]$; $-4x + 7 \geq 0$

(c) $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$

مجالها: $[3, 5) \cup (5, \infty)$; $x - 3 \geq 0$; $x \neq 5$

(d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{-x+2}}$

مجالها: $(-\infty, 2)$; $-x + 2 > 0$

(e) $f(x) = \frac{x-3}{x^2-5x+4}$

مجالها: $\mathbb{R} - \{1, 4\}$; $x^2 - 5x + 4 \neq 0$

مجموعة أصفار المقام $\{2\}$
: مجال v هو كل قيم x الحقيقية التي ينتج عنها $v(x)$ قيمة حقيقية.
: تكون مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي البسط والمقام هي $(\frac{4}{3}, \infty)$ باستثناء $\{2\}$
أي أن مجال $v = \frac{4}{3} \cup (2, \infty)$
أو $(\frac{4}{3}, 2) \cup (2, \infty)$

تساعدنا القواعد التالية على تحديد مجال الدالة:

1. مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} .
2. مجال الدالة الحدودية النسبية هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} عدا مجموعة أصفار المقام.
3. مجال الدالة $f(x) = |x|$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} .
4. مجال الدالة $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ حيث n عدد زوجي هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق الشرط $g(x) \geq 0$.
5. مجال الدالة $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ حيث n عدد فردي هو مجال الدالة g .
6. مجال الدالة $f(x) = g(x) \pm h(x)$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين h, g .
7. أي أن مجال $f = g \cap h$ مجال f هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين h, g .
8. أي أن مجال $f = g \cap h$ مجال f هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجالي الدالتين h, g عدا أصفار المقام $(h(x) \neq 0)$.

مثال (2)

أوجد مجال كل دالة مما يلي:

a) $f(x) = 2x^3 - 4x - \sqrt{2x-6}$

b) $g(x) = (2x^2 + x) / \sqrt{8-2x}$

c) $h(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}}{x^2-1}$

d) $u(x) = \frac{4}{\sqrt{-x}}$

الحل:

نفرض أن: $a(x) = \sqrt{2x-6}$, $b(x) = 2x^2 - 4x$

فيكون $f(x) = b(x) - a(x)$

مجال b هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} لأنها دالة كثيرة الحدود.

مجال a يتحقق إذا كان:

مجال a هو: $[3, \infty)$

: مجال $f = b \cap a$ مجال b

أي أن مجال f : $\mathbb{R} \cap [3, \infty) = [3, \infty)$

$2x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$

48







تمرين
2-1

مجال الدالة

Domain of the Function

المجموعة A تمارين مفالية

في التمارين (1-6)، استخدم اختبار المستقيم الرأسلي لتحديد ما إذا كان بيان كل علاقة مما يلي يمثل بيان دالة أم لا.



في التمارين (7-16)، حدّد مجال كل من الدوال التالية:

(7) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x^2 - 1$

(8) $g(x) = \sqrt{3x-7} + 2$

(9) $t(x) = \frac{\sqrt{-2x+3}}{x-1}$

(10) $h(x) = -\frac{3x-1}{5-2x}$

(11) $u(x) = \sqrt[3]{7-5x}$

(12) $v(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{3+x}}$

(13) $h(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{5+\sqrt{2x-1}}$

(14) $u(x) = \frac{\sqrt{3+4x-3}}{25-9x^2}$

(15) $v(x) = \frac{3}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$

(16) $w(x) = \sqrt[3]{x^2-2}(\sqrt{2x-3})$

20

حاول أن تحل

- 1 (a) يقطع المستقيم الرأسى البيان المرسوم على الأكثر بنقطة واحدة فقط، لذا فالبيان يمثل دالة.
(b) يقطع المستقيم الرأسى البيان المرسوم بنقطتين، لذا فالبيان لا يمكن أن يمثل دالة.

2 (a) $\mathbb{R}/\{4\}$

(b) $x - 9 \geq 0 ; x \geq 9 ; x \in [9, \infty)$

(c) $\begin{cases} 5 - 4x \geq 0 \\ x^2 + 4 \neq 0 \end{cases} ; x \leq \frac{5}{4} ; (-\infty, \frac{5}{4})$

(d) $x \neq 0 ; x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

b) لنفرض أن: $p(x) = \sqrt{8 - 2x}$ ، $m(x) = 2x^2 + x$
فيكون: $g(x) = m(x) \cdot p(x)$
مجال الدالة m هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} لأنها دالة كثيرة الحدود.
مجال الدالة p يتحقق إذا كان
مجال p هو $(-\infty, 4]$
أي أن مجال g : $\mathbb{R} \cap (-\infty, 4] = (-\infty, 4]$

c) لنفرض أن: $r(x) = x^2 - 1$ ، $q(x) = \sqrt[3]{1+x}$ حيث $h(x) = \frac{q(x)}{r(x)}$
مجال البسط q هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} لأنه جذر تكعيبي لكثيرة حدود.
المقام r دالة كثيرة حدود مجالها \mathbb{R} ومجموعة أصفار المقام هي $\{-1, 1\}$
مجال $h = (مجال\ q \cap مجال\ r) \setminus (مجموعة\ أصفار\ المقام)$
أي أن مجال h :
 $(\mathbb{R} \cap \mathbb{R}) \setminus \{-1, 1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

d) لنفرض أن: $t(x) = \sqrt{-x}$ ، $s(x) = 4$ حيث $u(x) = \frac{s(x)}{t(x)}$
مجال البسط s هو مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} لأنها دالة ثابتة.
مجال المقام t هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تجعل الجذور عدداً موجباً أو صفراً.
مجموعة أصفار المقام هي $\{0\}$
مجال $u = (مجال\ s \cap مجال\ t) \setminus (مجموعة\ أصفار\ المقام)$
أي أن مجال u :
 $(\mathbb{R} \cap (-\infty, 0]) \setminus \{0\} = (-\infty, 0)$

حاول أن تحل

2 أوجد مجال كل دالة مما يلي:

a) $f_1(x) = \frac{2x+5}{x-4}$

b) $f_2(x) = x^3 - 4x^2 - 4 + \sqrt{x-9}$

c) $f_3(x) = \frac{\sqrt{5-4x}}{x^2+4}$

d) $f_4(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2-5x}{x}}$


المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، اطلب (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (1) مجال الدالة $f(x) = \sqrt{(x-2)^2}$ هو \mathbb{R}
(2) مجال الدالة $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x-6}}$ هو $[3, \infty)$
(3) مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-x}$ هو $(-\infty, 0]$
(4) مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-2}\sqrt{x+3}$ هو $[-3, \infty)$
(5) مجال الدالة $f(x) = |x| - 2$ هو \mathbb{R}

في التمارين (6-11)، اطلب رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

(6) أي مما يلي لا يمثل بيان دالة.



(7) مجال الدالة $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+2x+1}$ هو:

- (a) \mathbb{R} (b) $\mathbb{R}/\{1\}$ (c) $\mathbb{R}/\{-1, 1\}$ (d) $\mathbb{R}/\{-1\}$

(8) مجال الدالة $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x}$ هو:

- (a) $\mathbb{R}/\{0\}$ (b) $[0, \infty)$ (c) $(-\infty, 0)$ (d) $(0, \infty)$

(9) مجال الدالة $f(x) = \frac{x-1}{x-\sqrt{x}}$ هو:

- (a) $\mathbb{R}/\{1\}$ (b) $\mathbb{R}/\{0, 1\}$ (c) $\mathbb{R} - \{0\}$ (d) $(0, \infty) \setminus \{1\}$

(10) مجال الدالة $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$ هو:

- (a) $(0, \infty)$ (b) $[1, \infty)$ (c) $(-1, \infty)$ (d) $[-1, \infty) \setminus \{0\}$

(11) لتكن $f(x) = x^2$ ، $g(x) = x\sqrt{x}$ ، $f \circ g$ فإن مجال الدالة هو:

- (a) $[-2, 2]$ (b) $[0, 2]$
(c) $(0, 2)$ (d) ليس أي مما سبق صحيحاً

2-2: الدوال التربيعية ونمذجتها

1 الأهداف

- يتعرف الدوال التربيعية واستخداماتها.
- يقدر متى يستخدم النموذج الخطي أو النموذج التربيعي.

2 المفردات والمفاهيم الجديدة

الدوال التربيعية – دالة خطية – الصورة العامة – حد من الدرجة الثانية – حد مطلق (ثابت) – مجال الدالة.

3 الأدوات والوسائل

عبوة بلاستيكية سعتها لتران – شريط لاصق – مسمار – مسطرة – ساعة رقمية – مياه – وعاء أو حوض – ورق رسم بياني – آلة حاسبة علمية.

4 التمهيد

(a) عيّن على المستوى الإحداثي النقاط التالية:

$$(3, 2), (1, 1), (-1, 0), (-3, -1)$$

اسأل الطلاب: هل تقع جميع هذه النقاط على مستقيم واحد؟ اشرح.

(b) عيّن على المستوى الإحداثي النقاط التالية:

$$(7, 3), (2, 2), (-1, 1), (-2, 0)$$

اسأل الطلاب: هل تقع جميع هذه النقاط على مستقيم واحد؟ اشرح.

(c) اسأل الطلاب: ما هي معادلة الخط المستقيم؟ كيف


توجد ميل الخط المستقيم الذي يمر بنقطتين على المستوى الإحداثي؟

الدوال التربيعية ونمذجتها

Quadratic Functions and their Modelling

2-2

عمل تماريني



قسم الفصل إلى مجموعات لإجراء هذه التجربة. حدد مهام أفراد مجموعتك. اطلب إلى أحدهم أن يراقب الزمن، واطلب إلى آخر أن يقوم بوضع العلامات. ثبت شريطاً لاصقاً بطول الزجاجاة واصنع ثقباً بجانب قاعدتها بواسطة مسمار.

أولاً: ضع علامة عند مستوى الثقب على الشريط اللاصق واكتب عند هذه العلامة (0). ثم أغلق الثقب بواسطة الشريط اللاصق. املا الزجاجاة بالماء، ثم ضع علامة عند مستوى الماء في الزجاجاة.

ثانياً: انزع الشريط اللاصق من على الثقب ودع الماء يتدفق. ضع علامة عند مستوى سطح الماء كل 10 s استمر على هذا النحو حتى يصل مستوى سطح الماء إلى الصفر.

1 قس المسافة من (0) إلى كل علامة، ثم ارسم جدولاً مسائلاً للجدول أدناه ودون فيه بياناتك.
2 مثل بياناتك على شبكة إحداثيات.
3 أشف خطاً إلى رسمك وضع نزع البيانات. هل تبدو البيانات خطية؟
4 أي منحنى مما يلي يبدو أكثر ملاءمة لتمثيل بياناتك؟

الزمن بالثانية (s)	مستوى الماء بالمليمتر (ml)
0	
10	
20	
30	
40	

سوف تعلم
• الدوال التربيعية واستخداماتها
• تقدير متى تستخدم النموذج الخطي أو النموذج التربيعي.

سوف تحتاج إلى...
• عبوة بلاستيكية سعتها لتران.
• شريط لاصق.
• مسمار.
• مسطرة.
• ساعة رقمية.
• مياه.
• وعاء أو حوض.
• ورق رسم بياني.
• آلة حاسبة علمية.

المفردات والمصطلحات
• الدوال التربيعية
• Quadratic Functions
• الصورة العامة
• General Form
• حد من الدرجة الثانية
• Quadratic Term
• حد مطلق (ثابت)
• Constant Term
• دالة خطية
• Linear Function
• مجال الدالة
• Domain of the Function

50

Quadratic Functions

الدوال التربيعية

من الممكن أحياناً أن تمثل البيانات غير الخطية، مثل البيانات التي جمعناها سابقاً في دعم تعاوني، بدالة تربيعية.

الصورة العامة للدالة التربيعية هي:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

حد مطلق (ثابت) الحد من الدرجة الأولى الحد من الدرجة الثانية

تمثل الدالة التربيعية بياناتاً بمنحنى متمائل حول المستقيم الراسي الذي يمر برأس المنحنى، ويسمى شكل المنحنى قطعاً مكافئاً parabola.

والإحداثي السيني لرأس هذا المنحنى $x = -\frac{b}{2a}$ وهو معادلة المستقيم الراسي الذي يسمى محور الصائِل.

تعريف الدالة الخطية:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = ax + b$$

$$y = ax + b$$

حيث $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$

و $b \in \mathbb{R}$ تسمى دالة خطية

وبها خط مستقيم.




عندما $a = 0$ تكون الدالة

$y = b$ ثابتة وبها خطاً

مستقيماً أفقياً.



نشاط



A(1, -4)
B(2, 0)
C(0, 2)
D(-3, 40)

أي النقاط الواردة أدناه تقع على منحنى الدالة:
 $f(x) = 3x^2 - 5x - 2$

أكبر أس لمغير ما في الدالة التربيعية هو (2)، وتكون الدالة خطية إذا كان أكبر أس لمغير فيها هو (1).

51

5 التدريس

تعرف الطالب سابقاً بيانات كثيرة، ووجد أن تمثيلها البياني يكون إما خطأً مستقيماً ومعادلته من الدرجة الأولى: $y = ax + b$ وإما خطأً منكسراً ومعادلته من الدرجة الأولى، وتتضمن قيمة مطلقة على المتغير أو على التعبير بكامله.

ولكن يوجد بيانات كثيرة تكون نمذجتها بدوال من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أكثر، وتمثل جميع قيم هذه البيانات.

في هذا الدرس، سوف يتعرف الطالب على بيانات يمكن نمذجتها بدوال تربيعية ومعادلتها:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

في المثال (2)

يتضمن الجدول قيماً، والمطلوب نمذجة هذه البيانات بدالة تربيعية، لذا نختار 3 قيم لإيجاد الثوابت a, b, c في الدالة التربيعية. وهكذا نحصل على الدالة التربيعية. أكد للطلاب أنه يجب أن تكون بقية القيم على منحنى هذه الدالة أو أن تحقق المعادلة.

في نشاط إثرائي

يبين الجدول نتائج ممكنة لاختبار مشابه لاختبار فقرة «عمل تعاوني».

اطلب إلى الطلاب استخدام ورق رسم بياني لتعيين النقاط كلها في مستوى إحداثي، ثم رسم منحنى الدالة التي حصلنا عليها: $f(t) = 0.00625t^2 - 19.5t + 120$. سوف يتأكدون من أن بقية النقاط موجودة على المنحنى.

مثال (1)

حدد ما إذا كانت الدالة: $f(x) = (3x - 4)(x + 2)$ خطية أم تربيعية.

الحل:

نكتب الدالة بالصورة العامة:

$$f(x) = (3x - 4)(x + 2)$$

$$f(x) = 3x^2 + 6x - 4x - 8$$

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 8$$

التوزيع بالضرب

جمع الحدود المتشابهة

الدالة في الصورة العامة تتضمن الحد $3x^2$ (من الدرجة الثانية) \therefore هي دالة تربيعية.

حاول أن تحل

حدد ما إذا كانت الدالة خطية أم تربيعية.

a $f(x) = 2x(x - 3)$

b $f(x) = (x - 2)(2x + 1)$

c $f(x) = (2x + 3)^2 - 4x^2 - 7x$

d $f(x) = 3(x^2 - 4x) - 3x^2 + 4$

نمذجة البيانات

تعلمت سابقاً كيفية كتابة نموذج خطي لبيانات، حيث يحدد الخط المستقيم نزعة معروفة للبيانات. ولكن يوجد بيانات لا يمكن نمذجتها خطياً وقد تكون الدالة التربيعية أفضل نمذجة لها.

مثال (2)

يبين الجدول التالي عدد القطع المستقيمة الواردة بين نقطتين مختلفتين إذا كان لدينا x نقطة، شرط ألا تكون 3 نقاط منها على مستقيم واحد.

عدد النقاط (x)	عدد القطع المستقيمة (y)
2	1
3	3
4	6
5	10
6	15
7	21

a إذا كانت العلاقة بين x و y تمليج بدالة تربيعية فاكذب هذه الدالة.

b أوجد عدد القطع المستقيمة التي تصل بين 10 نقاط، وبين 20 نقطة.

الحل:

c الصورة العامة للدالة التربيعية: $f(x) = ax^2 + bx + c$

بالتعويض بالأزواج (2, 1), (3, 3), (4, 6)، ينتج النظام التالي:

$$\begin{cases} 1 = 4a + 2b + c \\ 3 = 9a + 3b + c \\ 6 = 16a + 4b + c \end{cases}$$

إرشاد

الإجراءات اللازمة لحل

3 معادلات به 3 مجاهيل:

لحل ثلاث معادلات بثلاثة

مجاهيل يمكن استخدام طريقة

الحذف أو طريقة التعويض.

تقوم طريقة التعويض على

عزل أحد المجاهيل في

إحدى المعادلات والتعويض

عن هذا المجاهيل بما يساويه

في المعادلتين الباقيتين وهكذا

نحصل على نظام معادلتين

بمجهولين يسهل حله.

أما طريقة الحذف فتقوم على

استخدام العمليات الأربع على

المعادلات بحيث يتم إلغاء أحد

المجاهيل وينتج من ذلك نظام

معادلتين بمجهولين.

52

نطرح 1 من 2 ثم نطرح 3 فينتج:

$$\begin{cases} 2 = 5a + b \\ 3 = 7a + b \end{cases}$$

$$2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

نطرح 4 من 5 فينتج:

$$2 = 5 \cdot \frac{1}{2} + b \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$$

نعوض في 1 عن $a = \frac{1}{2}$:

نعوض في 1 عن $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$:

$$1 = 4\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + c$$

$$1 = 2 - 1 + c$$

$$c = 0$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}, c = 0$$

\therefore الدالة التربيعية هي: $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$

b عدد القطع المستقيمة التي تصل بين (10) نقاط هي $f(10)$:

$$f(10) = \frac{1}{2}(10)^2 - \frac{1}{2}(10)$$

$$f(10) = 50 - 5 = 45$$

أي يوجد 45 قطعة مستقيمة تربط بين 10 نقاط التين التين.

وبالمثل:

$$f(20) = \frac{1}{2}(20)^2 - \frac{1}{2}(20)$$

$$f(20) = 200 - 10 = 190$$

أي يوجد 190 قطعة مستقيمة تربط بين 20 نقطة التين التين.

حاول أن تحل

2 يبين الجدول التالي عدد الأقطار في المضلعات بحسب عدد أضلاعها.

عدد الأضلاع (x)	عدد الأقطار (y)
3	0
4	1
5	2
6	3
7	4

a إذا كانت العلاقة بين x و y تمليج بدالة تربيعية فاكذب هذه الدالة.

b مستخدماً العلاقة في a، أوجد عدد أقطار المضلع إذا كان عدد أضلاعه 10 وإذا كان عدد أضلاعه 15.

53

6 الربط

يحقق كل من النشاطين الإثرائيين ص 54 وص 55 في كتاب الطالب الربط بين بيانات من الحياة الواقعية وكيفية نمذجتها إلى دوال تربيعية تساعد على إيجاد توقعات.

7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في كتابة الإحداثي السيني لرأس المنحنى.

أكد على حفظ $x = \frac{-b}{2a}$

أشر إلى أن المستقيم الرأسي الذي معادلته $x = \frac{-b}{2a}$ هو محور تماثل لبيان الدالة التربيعية.

8 التقييم

تابع الطلاب باهتمام وهم يتعاملون مع فقرات «حاول أن تحل»، لأنها سوف تعطيك فكرة واضحة عن تفاعل الطلاب مع مفاهيم هذا الدرس ومهاراته.

نشاط إثرائي (تطبيقات حياتية)
يتم الجدول التالي بيانات اختيار مشابه للاختيار السابق في فقرة «عمل تعاوني»، حيث تمثل المدة الزمنية بالثواني (s)، y تمثل مستوى المياه بالملييلتر (ml).



t	4	8	12	16	20	24	28	32
y	112.3	104.8	97.5	90.4	83.5	76.8	70.3	64

أوجد دالة تربيعية تمثل هذه البيانات.

استخدم الدالة أعلاه لإيجاد مستوى المياه بعد مرور 36 s.

الحل:

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad y = f(t)$$

لكن الدالة التربيعية:

نختار من الجدول 3 أزواج تحقق الدالة.

الزوج (4, 112.3)

$$112.3 = a(4)^2 + b(4) + c$$

الزوج (12, 97.5)

$$97.5 = a(12)^2 + b(12) + c$$

الزوج (20, 83.5)

$$83.5 = a(20)^2 + b(20) + c$$

$$16a + 4b + c = 112.3$$

$$144a + 12b + c = 97.5$$

$$400a + 20b + c = 83.5$$

بالتبسيط نحصل على النظام:

$$a = \frac{1}{160}, \quad b = -\frac{39}{20}, \quad c = 120$$

باستخدام آلة حاسبة علمية ينتج:

$$\therefore f(t) = \frac{1}{160}t^2 - \frac{39}{20}t + 120$$

$$f(t) = 0.00625t^2 - 1.95t + 120$$

لاحظ أن النقطة (8, 104.8) تحقق المعادلة حيث

$$f(8) = \frac{1}{160}(8)^2 - 1.95(8) + 120 = 104.8 \checkmark$$

بالمثل يمكن إثبات أن بقية الأزواج المرتبة تحقق المعادلة.

$$f(36) = \frac{1}{160}(36)^2 - \frac{39}{20}(36) + 120 = 8.1 - 70.2 + 120 = 57.9$$

أي يصبح مستوى المياه حوالي 58cm

الربط بالتكنولوجيا

عناصر العمل المستخدمة

لحل ثلاث معادلات بالحاسبة

أضبط المفاتيح Mode

يظهر على الشاشة 8 خيارات

لراجع مستخدمة

اختر البرنامج: EQN

يظهر على الشاشة 4 مربع

للمعادلات.

اختر الصيغة:

2: $ax^2 + bx + c = d$

يظهر على الشاشة المعطيات:

1: $a \square b \square c \square d \square$

2: $\square \square \square \square$

3: $\square \square \square \square$

اكتب كلًا من المعادلات الثلاث

على الشكل التالي:

$ax^2 + bx + c = d$

أعلا المربعات في السطر الأول

بمعامل x يليه \square ثم معامل y

يلي \square ثم معامل z يليه \square ثم

قيمة d يليه \square

كرر العملية في السطرين التالي

والثالث.

اضبط الآن على المفاتيح

قيمة X: (المجهول الأول)

اضبط ثانية على المفاتيح

قيمة Y: (المجهول الثاني)

اضبط الثالثة على المفاتيح

قيمة Z: (المجهول الثالث)



54

تمارين
2-2

الدوال التربيعية ونمذجتها

Quadratic Functions and their Modelling

المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-8)، أي من الدوال التالية خطية؟ وأيها تربيعية؟

(1) $y = x + 4$

(2) $f(x) = x^2 - 7$

(3) $y = 3(x - 1)^2 + 4$

(4) $r(x) = -7x$

(5) $f(x) = \frac{1}{2}(4x + 10)$

(6) $y = 3x(x - 2)$

(7) $y = (2x + 1)(x - 2) + 4 - 2x^2$

(8) $y = (3x + 7)^2 - (9x^2 - 49)$

(9) التفكير الناقد: ما الحد الأدنى لعدد أزواج البيانات المطلوبة لإيجاد نموذج تربيعي لمجموعة ما من البيانات؟

في التمارين (10-12)، أوجد دالة تربيعية لكل مجموعة من البيانات.

(10)

x	-1	0	1	2	3
f(x)	4	-3	-6	-5	0

(11)

x	-1	0	1	2	3
f(x)	-1	0	3	8	15

(12)

x	-1	0	1	2	3
f(x)	17	20	17	8	-7

22

اختبار سريع

أي من هذه الدوال التالية تنمذج النقاط في الجدول التالي: (c)

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-10	-7	0	11

- (a) $f(x) = x^2 - 11$
 (b) $f(x) = x^2 + 2x - 7$
 (c) $f(x) = 2x^2 + 5x - 7$
 (d) $f(x) = 2x^2 + 5x + 7$

9 إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

1 - 3 تحقق من عمل الطلاب.

«نشاط»

$A(1, -4); B(2, 0), D(-3, 40)$

«حاول أن تحل»

- 1 (a) $f(x) = 2x^2 - 6x$ (تربيعية)
 (b) $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ (تربيعية)
 (c) $f(x) = 5x + 9$ (خطية)
 (d) $f(x) = -12x + 4$ (خطية)

نشاط إثرائي (الصلة بالواقع)

يقف أحد السباحين على منصة يبلغ ارتفاعها 3 m عن مستوى سطح المياه. يقفز إلى أعلى ثم يسقط في المياه. يبين الجدول التالي ارتفاعه y بالأمتار (m)، ابتعاده الأفقي عن المنصة x بالأمتار (m).



x	0.6	1	1.2	1.3	1.6	2	2.6	3
y	4.44	4.92	5.016	5.028	4.92	4.44	3	1.56

استخدم البيانات المدونة في الجدول لإيجاد معادلة تربيعية تنمذج العلاقة بين x, y . ثم تحقق.

الحل:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad y = f(x)$$

تكن الدالة التربيعية:

يضمن الجدول 8 أزواج مرتبة (x, y) أي أن القطع المكافئ يجب أن يمر بهذه النقاط. نختار 3 أزواج لجدد الثوابت (a, b, c)

$$4.44 = a(0.6)^2 + b(0.6) + c$$

الأزواج (0.6, 4.44)

$$4.92 = a(1)^2 + b(1) + c$$

الأزواج (1, 4.92)

$$5.016 = a(1.2)^2 + b(1.2) + c$$

الأزواج (1.2, 5.016)

$$0.36a + 0.6b + c = 4.44$$

بالتبسيط نحصل على النظام:

$$a + b + c = 4.92$$

$$1.44a + 1.2b + c = 5.016$$

$$a = -1.2, \quad b = 3.12, \quad c = 3$$

نستخدم آلة حاسبة لحل النظام فحصل على:

$$f(x) = -1.2x^2 + 3.12x + 3$$

لنتحقق، نعوض عن $(x, f(x))$ بقية أزواج قيم الجدول.

مثلاً: نعوض بالأزواج: (1.3, 5.028):

$$5.028 \stackrel{?}{=} -1.2(1.3)^2 + 3.12(1.3) + 3$$

$$5.028 \stackrel{?}{=} -1.2 \times 1.69 + 3.12 \times 1.3 + 3$$

$$5.028 \stackrel{?}{=} 5.028$$

∴ (1.3, 5.028) يحقق المعادلة.

بالعمل يمكنك إثبات أن بقية الأزواج المرتبة تحقق المعادلة.

تدريب إثرائي

استخدم البيانات المدونة في الجدول لإيجاد معادلة تربيعية تنمذجها ثم تحقق من بقية الأزواج في الجدول.

x	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	3	4
y	10	6.25	3	0.25	-2	-3.75	-5	-6	-5

المجموعة B تمارين موضوعية

- في التمارين (1-5)، ظل (a) إذا كانت العبارة صحيحة وظل (b) إذا كانت العبارة خاطئة.
- (1) الدالة $f(x) = kx^2 + x - 3$, $k \in \mathbb{Z}$ يمكن أن تكون دالة خطية. (a) (b)
- (2) الدالة $f(x) = x + \frac{1}{x}$ هي دالة خطية. (a) (b)
- (3) النقطة $A(1, 6)$ تنتمي إلى منحنى الدالة: $f(x) = (3x)(2x) + 6$ (a) (b)
- (4) الدالة $y = x(1-x) - (1-x^2)$ هي دالة خطية. (a) (b)
- (5) الدالة $f(x) = x^2 - x$ هي دالة تربيعية. (a) (b)
- في التمارين (6-10)، ظل رمز الدائرة الدال على الإجابة الصحيحة.
- (6) الدالة التربيعية التي جذورها الثابت يساوي -3 فيما يلي هي: (a) $y = (3x+1)(-x-3)$ (b) $y = x^2 - 3x + 3$
(c) $f(x) = (x-3)(x-3)$ (d) $y = -3x^2 + 3x + 9$
- (7) أي دالة مما يلي ليست دالة تربيعية: (a) $y = (x-1)(x-2)$ (b) $y = x^2 + 2x - 3$
(c) $y = 3x - x^2$ (d) $y = -x^2 + x(x-3)$
- (8) أي نقطة مما يلي تنتمي إلى منحنى دالة $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ ؟ (a) (3, 12) (b) (-1, -1) (c) (2, 3) (d) (-2, 22)
- (9) تكون الدالة $f(x) = (a^2 - 4)x^2 - (a - 2)x + 5$ دالة تربيعية لكل a تنتمي إلى: (a) \mathbb{R} (b) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$ (c) $\mathbb{R} - \{2\}$ (d) $\mathbb{R} - \{-2\}$
- (10) يمكن نمذجة العلاقة بين x , y في الجدول التالي بالدالة:
- | | | | |
|---|----|---|---|
| x | -1 | 1 | 2 |
| y | -1 | 3 | 8 |
- (a) $f(x) = x^2 + x + 1$ (b) $f(x) = x^2 + 2x - 1$
(c) $f(x) = -x^2 + 2x + 2$ (d) $f(x) = x^2 + 2x$

23

2 (a) $y = ax^2 + bx + c$

$$2 = a(4)^2 + b(4) + c$$

$$9 = a(6)^2 + b(6) + c$$

$$5 = a(5)^2 + b(5) + c$$

نحصل على: $a = \frac{1}{2}$, $c = 0$, $b = -\frac{3}{2}$

فتكون: $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$

(b) إذا كان عدد الأضلاع 10، فيكون عدد الأقطار 35
إذا كان عدد الأضلاع 15، فيكون عدد الأقطار 90.

«تدريب إثرائي»

$$y = x^2 - 6x + 3$$

تحقق من بقية قيم x في الجدول:

$$x = -1 \Rightarrow y = (-1)^2 - 6(-1) + 3 = 10$$

$$x = -0.5 \Rightarrow y = (-0.5)^2 - 6(-0.5) + 3 = 6.25$$

$$x = 0 \Rightarrow y = (0)^2 - 6(0) + 3 = 3$$

$$x = 0.5 \Rightarrow y = (0.5)^2 - 6(0.5) + 3 = 0.25$$

$$x = 1 \Rightarrow y = (1)^2 - 6(1) + 3 = -2$$

$$x = 1.5 \Rightarrow y = (1.5)^2 - 6(1.5) + 3 = -3.75$$

$$x = 2 \Rightarrow y = (2)^2 - 6(2) + 3 = -5$$

$$x = 3 \Rightarrow y = (3)^2 - 6(3) + 3 = -6$$

$$x = 4 \Rightarrow y = (4)^2 - 6(4) + 3 = -5$$

KuwaitMath.com

2-3: الدوال التربيعية والقطع المكافئة

1 الأهداف

- يوجد القيمة الصغرى أو القيمة العظمى لدالة تربيعية.
- يوجد معادلة محور التماثل.
- يرسم القطع المكافئ بدلالة إحداثيات رأسه.

2 المفردات والمفاهيم الجديدة

قطع مكافئ - رأس القطع المكافئ - محور التماثل.

3 الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة - ورق رسم بياني - جهاز إسقاط (Data Show) - حاسوب .

4 التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

- اكتب التعبير $(2x - 5)^2$ على صورة: $ax^2 + bx + c$.
- اكتب التعبير $(3x + 2)^2$ على صورة: $ax^2 + bx + c$.
- اكتب التعبير $x^2 + 10x + 25$ في صورة مربع كامل.
- اكتب التعبير $4x^2 - 12x + 9$ في صورة مربع كامل.
- اكتب التعبير $2x^2 + 9x + 4$ في صورة مربع كامل مع قيمة ثابتة.

5 التدريس

تعرفت على الدالة التربيعية ورسمها البياني بأنه قطع مكافئ. والآن سوف تتعرف على خواص القطع المكافئ بصورة إحداثيات الرأس وخط التماثل ومتى يكون مفتوحاً إلى الأعلى أو إلى الأسفل وكيفية استخدام الإزاحة لإيجاد معادلة قطع مكافئ إذا تمت إزاحته. وأخيراً كيف نستخدم خاصية القيمة الصغرى أو القيمة العظمى في مواقف حياتية.

الدوال التربيعية والقطع المكافئة Quadratic Functions and Parabolas

2-3

عمل تعاوني

عندما تقذف بعض الأشياء (الأجسام) في الهواء مثل الكرات في الصورة المقابلة، فإن مسار الأشياء (الأجسام) يكون على شكل قطع مكافئ.

1 استخدم الرسم البياني في الصورة إذا كان القياس بالسنتيمترات (cm)، فما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة؟

2 كون جدولاً بالقيم للمعادلة:

$$y = -0.35x^2 + 50$$


ما قيمة x التي تحصل عندها على القيمة العظمى لـ y ؟

3 كيف تقارن إجاباتك عن السؤالين رقم 1 و 2؟

تعلمت في ما سبق أن بيان الدالة التربيعية يكون على شكل منحنى يسمى قطعاً مكافئاً وسنوضح في هذا البند بعض خصائص القطع المكافئ في حالات خاصة.

القطع المكافئ التي تمثل دوال تربيعية

Parabolas Representing Quadratic Functions



محور التماثل (الناظر) يقسم القطع المكافئ إلى جزئين متطابقين (كل جزء هو صورة للآخر بالانعكاس في المحور)، لذلك فإن كل نقطة من نقاط القطع المكافئ تناظرها نقطة أخرى هي صورتها بالانعكاس في محور التماثل، وتقع كلتا النقطتين المتناظرتين على البعد نفسه من محور التماثل الذي معادلته $x = x_1$ حيث x_1 الإحداثي السيني لنقطة رأس القطع.

56

تمرن
2-3


الدوال التربيعية والقطع المكافئة Quadratic Functions and Parabolas

المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-4)، كل نقطة تقع على قطع مكافئ رأسه نقطة الأصل. اكتب معادلة هذا القطع المكافئ، واذكر ما إذا كان الرسم البياني مفتوحاً إلى أعلى أم إلى أسفل.

- (1) $F(3, 2)$ (2) $F(8, -12)$ (3) $H(-6, -2)$ (4) $G(-2, 5)$

في التمارين (5-10)، اكتب معادلة كل قطع مكافئ بدلالة إحداثيات رأسه.



24

في نشاط (1)

ناقش مع الطلاب الفقرتين (a), (b) واستمع جيدًا إلى ملاحظاتهم وأسئلتهم، وتأكد من أنهم قد وجدوا بشكل صحيح إحداثيات النقاط المناظرة للنقاط المعطاة على القطع المكافئ وأنهم قد تفهموا جيدًا الدور الذي يمثله محور التماثل في القطع المكافئ.

في المثال (2)

أكد للطلاب أن خطوط التوتر العالي والتي تستند على الأعمدة تأخذ دائمًا شكل قطع مكافئ مفتوحًا إلى الأعلى لأسباب تتعلق بدرجة الحرارة. شجعهم على القيام ببحث أو التواصل مع معلم مادة الفيزياء حول هذا الموضوع.

في المثال (3)

ركّز على إزاحة القطوع المكافئة والربط بين المعادلة: $y = ax^2$ ، والمعادلة: $y = a(x - h)^2 + k$ ، حيث إن رأس القطع المكافئ سوف يتحول من نقطة الأصل $(0, 0)$ إلى نقطة (h, k) دون أن يتغير شكله أو فتحته.

في المثالين (4)، (5)


أعط أمثلة بديلة، واطلب إلى متطوعين رسم قطع مكافئ بدلالة إحداثيات رأسه، ومحور التماثل وكيفية استخدامه.

في المثال (6)


وضّح للطلاب كيفية استخدام نموذج الدالة التربيعية التي تمثل قطعًا مكافئًا في موقف قد يشاهدونه في ملاعب كرة المضرب.

في المثال (7)

تطبيق القيمة العظمى في القطع المكافئ على الأرباح في مجال التسويق. وسوف يرى الطلاب لاحقًا أمثلة كثيرة تستخدم فيها القيمة العظمى أو القيمة الصغرى في مجالات إنتاجية وصناعية متعددة.



ملاحظة: معادلة الدالة التي تمثل قطعًا مكافئًا رأسه $(0, 0)$ هي: $y = ax^2$. لإيجاد قيمة a ، استخدم إحداثيات نقطة على المنحنى غير نقطة الرأس. معادلة محور تماثل هذا القطع المكافئ هي $x = 0$.



57

في التمارين (11-18)، ارسم منحنى كل دالة من الدوال التالية:

- (11) $y = (x+3)^2$ (12) $y = (x-2)^2$ (13) $y = -(x+1)^2$
(14) $y = -x^2 + 3$ (15) $y = (x+4)^2 + 1$ (16) $y = 3(x-2)^2 + 4$
(17) $y = -4(x+3)^2$ (18) $y = -2(x+1)^2 - 4$

- (19) الكتابة: صف الخطوات التي سوف تستخدمها لرسم الدالة: $y = -2(x-3)^2 + 4$ بيانيًا.
(20) السؤال المفتوح: اكتب معادلة لدالة يمثلها بيانيًا قطع مكافئ له محور تماثل التالي: $x = -2$.
في التمارين (21-25)، ارسم كل قطع مكافئ مستخدمًا المعلومات المعطاة. ثم اكتب معادلته بدلالة إحداثيات الرأس.
(21) الرأس $V(0, 0)$ ويمر بالنقطة $P(2, 10)$
(22) الرأس $V(0, 0)$ ويمر بالنقطة $P(-2, -10)$
(23) الرأس $V(0, 5)$ ويمر بالنقطة $P(1, -2)$
(24) الرأس $V(3, 1)$ والجزء المقطوع من محور الصادات -2
(25) الرأس $V(-2, 6)$ والجزء المقطوع من محور السينات 2

المجموعة B تمارين موضوعية

- في التمارين (1-5)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (b) إذا كانت العبارة خاطئة.
- (1) المعادلة $y = 2x^2 - 2(3-x)^2$ تمثل معادلة قطع مكافئ.
(2) القطع المكافئ $y = -\frac{1}{2}(x+2)^2 - 3$ فتحته إلى الأعلى.
(3) المعادلة $y = 2(x-1)^2 + 2$ يكون بيانيها أكثر اتساعًا من بيان الدالة $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$.
(4) توجد عند رأس منحنى الدالة $y = -(x-3)^2 - 2$ قيمة عظمى.
(5) منحنى القطع المكافئ $y = (-x+2)^2 + 3$ يمر بالنقطة $P(2, 3)$.
في التمارين (6-11)، ظلل رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.
(6) الدالة $y = a(3-x)^2 - 2$ يكون رسمها أوسع من رسم بيان الدالة $y = -2x^2$ إذا كان:
(a) $|a| = 2$ (b) $|a| > 2$ (c) $a < 2$ (d) $|a| < 2$
(7) معادلة القطع المكافئ $y = 2x^2$ الذي تم إزاحة رأسه وحدتين يسارًا و4 وحدات لأعلى هي:
(a) $y = (2x+2)^2 + 4$ (b) $y = 2(x-2)^2 + 4$
(c) $y = 2(x+2)^2 + 4$ (d) $y = 2(x+2)^2 - 4$

25

6 الربط

الأمثلة (7), (6), (2) تحقق الربط بين القطع المكافئ واستخداماته في مجالات متعددة.

7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في كتابة إحداثيات رأس القطع

المكافئ من المعادلة: $y = a(x - h)^2 + k$

ساعدهم على المقارنة بأمثلة متعددة. مثال ذلك:


$$y = 2(x + 3)^2 - 4, \quad h = -3, \quad k = -4$$

وبالتالي إحداثيات الرأس هي $(-3, -4)$

8 التقييم

راقب الطلاب وهم يجيبون عن أسئلة فقرات «حاول أن تحل» للتأكد من سلامة أدائهم وفهمهم لما ورد في الدرس.

كل القطوع المكافئة لها الشكل العام نفسه. ويتغير اتساع القطع المكافئ تبعاً لتغير معامل حد الدرجة الثانية.



الصلة بالواقع

الكهرباء: توضع أعمدة خط التوتر العالي لنقل الطاقة الكهربائية بارتفاع مناسب فإذا كان البعد الرئيس بين العمودين هو 400 m، يتدلى السلك حوالي 2 m في الوسط بين العمودين.




أوجد معادلة القطع المكافئ والتي قد تمثل سلك أبراج خط التوتر العالي.

افرض أن رأس القطع المكافئ هو نقطة الأصل.

الحل:

ابداً برسم الشكل



(الرسم قربي)

$$y = ax^2$$

$$a(200)^2 = 2$$

$$a = \frac{2}{40000}$$

$$a = 0.00005$$

بما أن النقطة $(200, 2)$ تقع على الرسم البياني، عوض بالقيم في المعادلة:

المعادلة التي نصف الشكل الناتج عن السلك هي: $y = 0.00005x^2$

اختبار سريع


1 أوجد معادلة قطع مكافئ إحداثيات رأسه

$(-3, 4)$ ويمر بالنقطة $(-2, 1)$

$$f(x) = -3(x + 3)^2 + 4$$

2 مستخدماً الرسم التالي، اكتب معادلة القطع


المكافئ بدلالة إحداثيات الرأس ثم بالصورة العامة.



بدلالة إحداثيات الرأس: $f(x) = -(x - 3)^2 + 4$

بالصورة العامة: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

(8) الشكل أدناه يمثل منحنى قطع مكافئ معادلته هي:



(a) $y = (x - 2)^2 + 2$

(b) $y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 + 2$

(c) $y = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 - 2$

(d) $y = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 2$

(9) القطع المكافئ $y = a(x - h)^2 + k$ يقطع المحورين على الأكثر في:

(a) نقطة

(b) نقطتين

(c) 3 نقاط

(d) 4 نقاط

(10) القيمة الصغرى للدالة $y = \frac{1}{3}(3 - x)^2 - 2$ هي عند النقطة:


(a) $(3, -2)$

(b) $(-3, 2)$

(c) $(-3, -2)$

(d) $(3, 2)$

(11) يقع جسر على شكل قطع مكافئ فوق نهر. يبلغ البعد بين قاعدتيه 20 m وارتفاعه الأقصى 8 m معادلة القطع المكافئ هي:



(a) $y = 0.08(x - 10)^2 + 8$

(b) $y = -0.08(x - 10)^2 + 8$

(c) $y = -0.08(x - 20)^2 + 8$

(d) $y = 0.08(x + 10)^2 + 8$

«عمل تعاوني»

- 1 50 cm
- 2 $y = -0.35x^2 + 50$

x	0	2	4	5	6
y	50	48.6	44.4	41.25	37.4

أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة هو 50 cm عند $x = 0$.
نطابق النتائج عند النظر إلى الرسم وعند حساب أعلى
قيمة لـ y ، فنحصل على $y = 50$ كأعلى قيمة.

3 تتنوع الإجابات. مثال:

القيمة العظمى لـ $y =$ الارتفاع الأقصى

«نشاط (1)»

- (a) (2, 0)
- (b) $x = 2$
- (c) $P'(3, 2)$
 $Q(0, 8)$

«حاول أن تحل»

1 رأس القطع المكافئ هو النقطة (0, 0)

في المعادلة: $y = ax^2$

(a) يمر المنحنى في النقطة $E(4, 2)$ نعوض:

$$2 = a(4)^2 \quad a = \frac{1}{8}$$

والمعادلة: $y = \frac{1}{8}x^2$

والمنحنى مفتوح إلى الأعلى.

(b) $a = -5$ ، ومنه $a(1)^2 = -5$


والمعادلة: $y = -5x^2$

والمنحنى مفتوح إلى الأسفل.

2 $y = ax^2$ المنحنى يمر بالنقطة (2, 5)

$$5 = a(2)^2, \quad a = \frac{5}{4}$$


المعادلة: $y = \frac{5}{4}x^2$



حاول أن تحل
2 البيان المقابل يمثل دالة: $y = ax^2$
أوجد معادلة هذه الدالة.

معادلات بعض القطوع المكافئة بدلالة إحداثيات رؤوسها وخواصها


Equations of some Parabolas in terms of the Coordinates of Vertices



ليس بالضرورة أن يكون رأس القطع المكافئ نقطة الأصل.
المعادلة في الصورة: $y = a(x - h)^2 + k$, $a \neq 0$, $h, k \in \mathbb{R}$
تسمى **معادلة القطع المكافئ بدلالة إحداثيات رأسه** (h, k) وهي عبارة عن إزاحة لبيان منحنى
الدالة: $y = ax^2$
ونذكر أنه عندما تكون h, k موجبتين، فإن الإزاحة تحرك المنحنى عدد h من الوحدات
يمينًا وعدد k من الوحدات إلى الأعلى كما في الشكل. وعندما تكون h سالبة يزاح المنحنى عدد من الوحدات إلى اليسار،
وعندما تكون k سالبة، يزاح المنحنى عدد من الوحدات إلى الأسفل.

بعض خواص القطوع المكافئة

المعادلة على الصورة: $y = a(x - h)^2 + k$ ، هي دالة مكوّنة بدلالة إحداثيات الرأس، وهذه المعادلة تملك بالمعلومات التالية:
■ رأس المنحنى هو النقطة (h, k) ومحور التماثل هو الخط: $x = h$
■ تكون فتحة القطع المكافئ إلى الأعلى عندما تكون a موجبة، وتكون فتحة القطع المكافئ إلى الأسفل عندما تكون a سالبة.
■ إذا كان $|a| < 1$ ، فإن الرسم سوف يكون أوسع من رسم الدالة: $y = x^2$
■ إذا كان $|a| > 1$ ، فإن الرسم سوف يكون أضيق من رسم الدالة: $y = x^2$



مثال (3)
في الشكل المقابل اكتب معادلة القطع المكافئ الذي رأسه $V(3, 4)$ ويمر بالنقطة $P(5, -4)$
الحل:
رأس القطع: $(h, k) = (3, 4)$
لذلك استخدم المعادلة، ثم حلها لإيجاد قيمة a :

3 رأس القطع المكافئ هو النقطة (2, 4)

فتكون المعادلة: $y = a(x - 2)^2 + 4$

يمر المنحنى في النقطة (0, 0)

فيكون: $0 = a(0 - 2)^2 + 4$ ومنه $a = -1$

والمعادلة: $y = -(x - 2)^2 + 4$


4 رأس المنحنى (-3, 1)

محور التماثل $x = -3$

إذا $x = 0$ تكون $y = 10$ ، إذا $x = -6$ تكون $y = 10$

النقطة (0, 10) هي انعكاس للنقطة (-6, 10) في

محور التماثل: $x = -3$



$$y = a(x - h)^2 + k$$

$$y = a(x - 3)^2 + 4$$

$$-4 = a(5 - 3)^2 + 4$$

$$-8 = 4a$$

$$-2 = a$$

$$h = 3, k = 4$$

عوض بالنقطة (5, -4)


اختصر

حل لإيجاد قيمة a

∴ معادلة القطع المكافئ هي: $y = -2(x - 3)^2 + 4$

حاول أن تحل

أوجد معادلة القطع المكافئ في الرسم المقابل.



يمكنك استخدام خصائص القطع المكافئ لرسم بيان الدوال التربيعية.

مثال (4)

ارسم منحنى الدالة: $y = 2(x + 1)^2 - 2$ مستخدماً خواص القطوع المكافئة.

الحل:

∴ المعادلة تربيعية على الصورة $y = a(x - h)^2 + k$ فهي تمثل قطعاً مكافئاً.

$$h = -1, k = -2$$

∴ رأس المنحنى $(-1, -2)$

وكذلك $a = 2, 2 > 0$


∴ فتحة المنحنى لأعلى

والرأس عنده قيمة صغرى للدالة.

معادلة محور التماثل هي: $x = h$

∴ $x = -1$ هو محور التماثل.

نرسم محور التماثل.



60

أوجد نقطة أخرى: عند $x = 0$ فإن $y = 0$


أي أن المنحنى يمر بنقطة الأصل.

حدد انعكاس نقطة الأصل حول محور التماثل.

ارسم منحنى يمر في النقاط الثلاث.

حاول أن تحل

4 ارسم منحنى الدالة: $y = (x + 3)^2 + 1$



مثال (5)

ارسم منحنى الدالة: $y = -0.5(x - 2)^2 + 3$ مستخدماً خواص القطوع المكافئة.

الحل:

∴ المعادلة تربيعية على الصورة $y = a(x - h)^2 + k$ فهي تمثل قطعاً مكافئاً

$$h = 2, k = 3$$

∴ رأس المنحنى $(2, 3)$

∴ $a = -0.5, -0.5 < 0$

∴ فتحة المنحنى إلى أسفل والرأس عنده قيمة عظمى للدالة.

معادلة محور التماثل هي: $x = h$

∴ $x = 2$ هو محور التماثل

نرسم محور التماثل.

أوجد نقطة أخرى: عند $x = 0$ فإن $y = 1$


حدد موقع النقطة $(0, 1)$

حدد موقع انعكاس النقطة $(0, 1)$ حول محور التماثل وهي $(4, 1)$.

ارسم منحنى يمر في النقاط الثلاث.

حاول أن تحل

5 ارسم منحنى الدالة: $y = -2(x - 3)^2 - 1$



61


5 رأس المنحنى $(-1, 3)$ ، محور التماثل $x = 3$ إذا

$x = 0$ فتكون $y = -19$ إذا $x = 6$ فتكون $y = 19$

وبالتالي النقطة $(0, -19)$ هي انعكاس للنقطة

$(6, 19)$ في محور التماثل $x = 3$

الرسم البياني:



مثال (6) تطبيقات حياتية

رميت كرة من فوق حاجز بارتفاع 150 cm عن سطح الملعب فاجتازت الكرة الحاجز الشبكي ثم سقطت على الأرض مبندة 300 cm عن قاعدة الحاجز. استخدم الحاجز كمحور تناظر واكتب معادلة تمذج مسار الكرة. افترض أن نقطة الأصل هي حيث يتقاطع الحاجز مع الأرض.



يمكن نمذجة المسألة كما بين الرسم، باعتباره قطع مكافئ.

معادلة القطع المكافئ بدلالة إحداثيات الرأس هي:

$$y = a(x - h)^2 + k$$

∴ إحداثيات الرأس: $(0, 150)$

$$\therefore h = 0, k = 150$$


$$y = a(x - 0)^2 + 150, \quad y = ax^2 + 150$$

يمر البيان بالنقطة $(300, 0)$ فيكون:

$$a(300)^2 + 150 = 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{600}$$

معادلة مسار الكرة هي:

$$y = -\frac{1}{600}x^2 + 150$$



حاول أن تفعل

6 في ملعب لكرة المضرب، رمي لاعب الكرة من فوق الشبكة بارتفاع 1 m عن سطح الملعب فاجتازت الكرة الشبكة ثم سقطت على الأرض مبندة 6 m عن قاعدتها.

افترض أن نقطة الأصل هي حيث يتقاطع المستقيم الرأس في منتصف الشبكة مع أرض الملعب.



استخدم المستقيم كمحور تناظر واكتب معادلة تمذج مسار الكرة.

الربط بالحياة:

كرة المضرب (Tennis) هي إحدى الرياضات الرياضية الحائزة على عدد كبير من تشجيع الجماهير. حيث يشارى فيها لاعبان في مباريات الفردى أو فريقان مكونان من لاعبين في مباريات الزوجي.

يستخدم كل لاعب مضرب يستخدمه في إرسال الكرة إلى منطقة المعصم بهدف تسجيل النقاط. وما يميز لعبة كرة المضرب عن غيرها من بقية الألعاب هو أنها تلعب بأجزاء كثيرة من الجسم فضلاً عن التوافق بين الذهن وكفاءة عضلات الجسم.



6 الرأس (0, 1)

$$y = a(x - h)^2 + k$$

$$y = a(x - 0) + 1$$

$$y = ax^2 + 1$$

يمر المنحنى بالنقطة (6, 0) فيكون: $0 = 36a + 1$

$$\text{أي } a = -\frac{1}{36} \text{ والمعادلة: } y = -\frac{1}{36}x^2 + 1$$

7 في الدالة: $y = -100(x - 1.75)^2 + 300$

إذا لم يكن هناك لا ربح ولا خسارة فتكون $y = 0$

$$\text{ومنه: } -100(x - 1.75)^2 + 300 = 0$$

$$x = 3.48 \text{ دنانير أو } x = 0.018 \text{ دينار}$$

«نشاط (2)»

$$(a) \frac{1}{2}, 1, 2$$

(b) كلما صغر مُعامل حد الدرجة الثانية توسعت فتحة بيان الدالة التربيعية.

مثال (7) تطبيقات حياتية

يبيع أحد المحلات عددًا أكبر من الفطائر عندما يخفض السعر، لكن ربحه يتغير. تُمثل أرباح هذا المحل (بالدينار) وفقًا للدالة التالية: $y = -100(x - 1.75)^2 + 300$ حيث x أرباح هذا المحل بالدينار، حيث x سعر الفطيرة بالدينار. يرغب صاحب المحل في تحقيق القيمة العظمى لربحه من المبيع.

a صف المجال الواقعي للدالة.

b أوجد أرباحه اليومية إذا باع الفطيرة الواحدة، بـ 2 دينار، وإذا باع الفطيرة الواحدة بـ 1.25 دينار.

c ما السعر الذي يجب أن يبيع به الفطيرة الواحدة ليحقق الربح الأكبر؟ وما قيمة هذا الربح؟

الحل:

a حيث إن x تمثل سعر الفطيرة يجب أن تكون $x > 0$.

b في المعادلة:

$$y = -100(x - 1.75)^2 + 300$$

عند $x = 2$

$$y = -100(2 - 1.75)^2 + 300$$

$$y = 293.75$$

أي يكون ربحه 293.75 دينارًا.

عند $x = 1.25$

$$y = -100(1.25 - 1.75)^2 + 300$$

$$y = 275$$

أي يكون ربحه 275 دينارًا.

c تمثل الدالة قطعًا مكافئًا له قيمة عظمى لأن $-100 < 0$ ، وبالتالي إحداثيات رأسه (1.75, 300)، حيث إن 1.75 دينار هو السعر الذي يحقق الربح الأكبر وقيمة هذا الربح الأكبر هي 300 دينار.

حاول أن تحل

7 في المثال (7) أوجد سعر مبيع الفطيرة الواحدة إذا لم يربح ولم يخسر في أحد الأيام.

4-2: مقارنة بين صورة معادلة الدالة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة

1 الأهداف

- يوجد رأس منحنى الدالة من الدالة التربيعية بالصورة العامة.
- يكتب المعادلات بدلالة إحداثيات الرأس وفي الصورة العامة.

2 المفردات والمفاهيم الجديدة

رأس القطع المكافئ - الصورة العامة.

3 الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة بيانية - ورق رسم بياني - جهاز إسقاط (Data Show) - حاسوب.

4 التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

- (a) أوجد إحداثيات رأس القطع المكافئ ومحور التماثل في: $y = (x + 2)^2 - 3$.
- (b) أوجد إحداثيات رأس القطع المكافئ ومحور التماثل في: $y = 3x^2 + 4$.
- (c) أوجد إحداثيات انعكاس النقطة $(3, -3)$ في محور تماثل القطع المكافئ حيث معادلته: $y = 2(x - 2)^2 - 5$.

5 التدريس

يقدم هذا الدرس مقارنة بين صورة المعادلة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة وكيفية التحويل من الصورة $y = a(x - h)^2 + k$ إلى الصورة $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) ويوفر الربط بين الثوابت a, b, c و h, k ويوجد علاقة بين معادلة محور التماثل $x = h$ مع $-\frac{b}{2a}$ فنحصل على $x = -\frac{b}{2a}$. تابع بدقة فقرة «عمل تعاوني» للتأكد من أنهم استطاعوا الربط جيّدًا بين الصورة العامة والصورة بدلالة إحداثيات الرأس.

4-2

مقارنة بين صورة معادلة الدالة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة

Comparing Vertex and General Form Equation of Quadratic Functions

عمل تعاوني

اعمل في مجموعات قوامها أربعة طلاب.
أولاً: اطلب من كل مجموعة رسم بيان زوج من المعادلات التالية. ويمكنك استخدام الآلة الحاسبة البيانية في رسم بيان زوج من المعادلات التالية على الشاشة نفسها لآلة الحاسبة.

	$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ (الصورة العامة)	a	b	$y = a(x - h)^2 + k, a \neq 0$ (إحداثيات رأس المنحنى)	h
1	$y = x^2 - 4x + 4$			$y = (x - 2)^2$	
2	$y = x^2 + 6x + 8$			$y = (x + 3)^2 - 1$	
3	$y = -3x^2 - 12x - 8$			$y = -3(x + 2)^2 + 4$	
4	$y = 2x^2 + 12x + 19$			$y = 2(x + 3)^2 + 1$	

- ما الذي تلاحظه في رسوم كل زوج من المعادلات؟
هل كل زوج من المعادلات يمثل معادلتين متكافئتين؟
فأنتا: أقطب: أكمل الجدول أعلاه.
انظر إلى القيم h, b في أول زوجين من المعادلات. اكتب صيغة توضح العلاقة بين h, b .
استخدم الزوجين الآخرين من المعادلات لتوسع الصيغة التي حصلت عليها. ولكي توضح العلاقة بين a, b, h .
ثالثاً: ما العلاقة بين محور التماثل ورأس القطع المكافئ؟
ما معادلة محور التماثل للقطع المكافئ: $y = ax^2 + bx + c$.
ما معادلة محور التماثل للقطع المكافئ: $y = 2x^2 + 10x + 7$.

في فقرة «عمل تعاوني»، بحثت في كيفية تحديد رأس منحنى الدالة التربيعية. عندما تكتب معادلة الدالة في الصورة العامة، فإن الإحداثي **اليساري لرأس القطع المكافئ** يكون $-\frac{b}{2a}$ ، ولايجاد الإحداثي **الصادي** k ، عوض بقيمة الإحداثي **اليساري** h في المعادلة ثم بسط.

سوف تعلم
• إيجاد رأس منحنى الدالة من التربيعية بالصورة العامة.
• كتابة المعادلات بدلالة إحداثيات الرأس وفي الصورة العامة.

المفردات والمصطلحات
• رأس القطع المكافئ
Vertex of a Parabola
• الصورة العامة
General Form

ربط بالحياة:

تسمح الآلات الحاسبة البيانية برسم بيانات الدوال ومنها الدوال التربيعية. تختلف المعطيات الممنوعة من حاسبة لأخرى لكن معظمها بسط كثيرًا. عملية الرسم كالتالي:

- 1 اضغط على **Y=**
2 اكتب معادلة الدالة.
3 اضغط على **EXE**.
4 يظهر بيان الدالة على الشاشة.



64

تمارين
2-4

مقارنة بين صورة المعادلة التربيعية بدلالة إحداثيات رأس المنحنى والصورة العامة

Comparing Vertex and General Form Equation of Quadratic Functions

المجموعة A تمارين مقالية

في التمارين (1-7)، اكتب كلاً من الدوال التالية بدلالة إحداثيات الرأس:


- (1) $y = x^2 - 4x + 6$ (2) $y = x^2 + 2x + 5$ (3) $y = 4x^2 + 7x$
(4) $f(x) = -2x^2 + 35$ (5) $y = -8x^2$ (6) $f(x) = 2x^2 + x$
(7) $y = -3x^2 - 2x + 1$

في التمارين (8-13)، اكتب معادلة كل قطع مكافئ في الصورة العامة.

- (8) $y = (x + 3)^2 - 4$ (9) $f(x) = 2(x - 2)^2 + 5$ (10) $f(x) = -(x - 7)^2 + 10$
(11) $y = (5x + 6)^2 - 9$ (12) $f(x) = -(3x - 4)^2 + 6$ (13) $f(x) = -2x(x + 7) + 8x$

(14) التفكير الناقد: معادلة أحد الرسمين البيانيين أدناه هي: $y = x^2 - 8x + 18$

اكتب معادلة الرسم البياني الآخر في الصورة العامة.



(15) منحنى الدالة: $y = 2x^2 - 12x + c$ له رأس عند النقطة $(3, 5)$. فما قيمة c ؟

(16) منحنى الدالة: $y = ax^2 + bx + 8$ له رأس عند النقطة $(2, -4)$. فما قيم a, b ؟

27

في المثال (1)

شجع الطلاب على إيجاد أولاً قيمة $h = \frac{-b}{2a}$ ، ثم تعويض هذه القيمة في الصيغة العامة لإيجاد قيمة k ، وبذلك يكون التحول من الصورة العامة إلى الصورة بدلالة إحداثيات الرأس.

في المثال (2)

يؤكد الصلة بالواقع واستخدام المعطيات الجديدة في إيجاد إحداثيات رأس القطع المكافئ التي تعبر عن القيمة العظمى أو القيمة الصغرى إذا تمّ تعويض $x = -\frac{b}{2a}$ في المعادلة الأساسية أي في الصورة العامة.

في المثال (3)

تحويل من الصورة بدلالة إحداثيات الرأس إلى الصورة العامة وذلك بتفكيك المربع الكامل، ثم تجميع الحدود المتشابهة.

في المثال (4)

يستخدم رأس القطع المكافئ لإيجاد قيم مجهولة في معادلته.

في المثال (5)

تطبيقات حياتية باستخدام رأس القطع المكافئ لإيجاد قيمة عظمى.

6 الربط

يوفر هذا الدرس أمثلة متعددة في الاقتصاد والتسويق والإنشاءات، وذلك باستخدام القيمة العظمى عند إحداثيات رأس القطع المكافئ كما في المثالين (5)، (2)

7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في إيجاد الإحداثي السيني لرأس القطع المكافئ فيكتبون: $h = \frac{b}{2a}$ أو $h = -\frac{b}{a}$ أشر إليهم أن الإحداثي السيني لرأس القطع المكافئ هو $h = -\frac{b}{2a}$ ، ثم نعوض هذه القيمة في الصورة العامة لإيجاد الإحداثي الصادي.

مثال (1)

أكتب الدالة: $y = 2x^2 + 10x + 7$ بدلالة إحداثيات الرأس.
الحل:
صورة المعادلة بدلالة إحداثيات الرأس (h, k) هي: $y = a(x - h)^2 + k$
الإحداثي السيني:
استخدم $-\frac{b}{2a}$ لإيجاد الإحداثي السيني
 $h = -\frac{b}{2a}$
 $= -\frac{10}{2(2)}$
 $= -2.5$
عوض قيم a, b
الإحداثي الصادي:
عوض $x = -2.5$
 $k = 2(-2.5)^2 + 10(-2.5) + 7$
 $= -5.5$
في المعادلة الأصلية
في المعادلة بدلالة إحداثيات الرأس هي: $y = 2(x + 2.5)^2 - 5.5$
حارول أن يحل
أكتب الدالة: $y = 2x^2 + 10x + 5$ بدلالة إحداثيات رأس المنحنى، ثم ارسم بيانيها.

المصطلحات مع:
المحيط: Perimetre (P)
المساحة: Area (A)
الطول: Length (L)
العرض: Width (W)
الارتفاع: Height (h)
المستطيل: Rectangle

يمكنك استخدام رأس القطع المكافئ في تطبيقات حياتية تتطلب إيجاد أكبر مساحة وأصغر مساحة

مثال (2)

الصلة بالواقع
إذا قمت بالخطيئة لصنع بروز مستطيل الشكل لمجموعة من الصور، وذلك لتقديمها كهدية تخرج لأحد الأصدقاء، وكان لديك قطعة من الخشب طولها 2.8 m لصنع بروز. فما أبعاد البروز التي تعطي أكبر مساحة (A) لوضع مجموعة الصور؟ وما هي أكبر مساحة؟
الحل:
استخدم صيغة المحيط (P) لإيجاد تعبير رياضي (مقدار) يعبر عن طول البروز (L) بدلالة العرض (W).
المحيط $2 = (\text{الطول} + \text{العرض})$
 $P = 2(L + W)$
 $2(W + L) = 280$
 $L = 140 - W$
بسط، وحل لإيجاد الطول

مراجعة سريعة:
إيجاد محيط المستطيل ومساحته، استخدم ما يلي:
المحيط $2 = (\text{الطول} + \text{العرض})$
 $P = 2(L + W)$
المساحة $= \text{الطول} \times \text{العرض}$
 $A = L \times W$

المجموعة B تمارين موضوعية

- في التمارين (1-4)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.
- (1) المعادلة $y = -2(x + 3)^2 + 4$ هي معادلة قطع مكافئ بدلالة إحداثيات رأس المنحنى. (a) (b)
- (2) المعادلة $y = 3(x - 2)^2 + 4(x - 2) + 1$ هي معادلة قطع مكافئ في الصورة العامة. (a) (b)
- (3) رأس القطع المكافئ الذي معادلته $y = x^2 - 2x - 3$ هو $(1, -4)$. (a) (b)
- (4) معادلة محور التماثل للقطع المكافئ، $y = 3x^2 + 12x + 8$ هي $y = -4$. (a) (b)
- في التمارين (5-12)، ظلل رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.
- (5) رأس القطع المكافئ الذي معادلته $y = ax^2 + 2ax + 5$ ، $a \neq 0$ يمكن أن يكون: (a) (1, 1) (b) (-1, 1) (c) (1, 5) (d) (-1, 5)
- (6) معادلة القطع المكافئ المار بالنقطة $(-3, 10)$ ورأسه $(0, 1)$ هي: (a) $y = 5x^2 + 1$ (b) $y = -3x^2 + 10$ (c) $y = x^2 + 1$ (d) $y = -x^2 - 1$
- (7) منحنى الدالة $y = -2x^2 + 4x - 5$ له رأس عند النقطة: (a) $(-2, -3)$ (b) $(1, -3)$ (c) $(1, -1)$ (d) $(-1, -3)$
- (8) يقع رأس منحنى $y = -x^2 - 16x - 62$ في الربع: (a) الأول (b) الثاني (c) الثالث (d) الرابع
- (9) معادلة محور التماثل للقطع المكافئ $y = x^2 - 6x + 2$ هي: (a) $x = 12$ (b) $x = 6$ (c) $x = 3$ (d) $x = 2$
- (10) المساحة العظمى بالوحدات المربعة لمستطيل محيطه 128 m هي: (a) 4096 (b) 1024 (c) 256 (d) 32
- (11) يُمذَج مدخول إحدى الشركات بالعلاقة $R = -15p^2 + 300p + 12000$ حيث p (بالدينار) هو سعر مبيع إحدى القطع المنتجة. قيمة p التي تعطي أعلى مدخول هي: (a) 30 (b) 10 (c) 15 (d) 12
- (12) أي منحنى من الدوال أدناه له خط تماثل $x = 3$? (a) $y = 2(x + 3)^2$ (b) $y = x^2 - 6x + 9$ (c) $y = x^2 + 3x + 6$ (d) $y = 4(x + 3)^2$

8 التقييم

توفر فقرات «حاول أن تحل» فرصة مهمة للمعلم ليتعرف على مدى متابعة الطلاب لما ورد في هذا الدرس وكيفية التحويل من صيغة إلى أخرى دون ارتكاب أخطاء.

اختبار سريع

1 اكتب الدالة: $f(x) = 2x^2 + 8x - 5$

بدلالة إحداثيات الرأس.

$$f(x) = 2(x + 2)^2 - 13$$

2 اكتب الدالة: $f(x) = (x + 2)^2 - 1$

بالصورة العامة.

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

9 إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

أولاً: (a) تحقق من عمل الطلاب على الآلة الحاسبة.

(b) يجب أن تبين الآلة الحاسبة الرسوم البيانية

نفسها لكل زوج من المعادلات في الصورة

العامة والصورة بدلالة إحداثيات الرأس.

(c) كل زوج من المعادلات، يمثل شكلين مختلفين

للمعادلة نفسها.

ثانياً: (a)

$y = ax^2 + bx + c$ (الصورة العامة)	a	b	$y = a(x - h)^2 + k$ (صورة المعادلة بدلالة إحداثيات رأس المنحنى)	h
$y = x^2 - 4x + 4$	1	-4	$y = (x - 2)^2$	2
$y = x^2 + 6x + 8$	1	6	$y = (x + 3)^2 - 1$	-3
$y = -3x^2 - 12x - 8$	-3	-12	$y = -3(x + 2)^2 + 4$	-2
$y = 2x^2 + 12x + 19$	2	12	$y = 2(x + 3)^2 + 1$	-3

اكتب معادلة لإيجاد مساحة البرواز
المساحة = الطول × العرض
عَرِّض الطول والعرض
بسط

المساحة دالة تربيعية وبيانها قطع مكافئ له قيمة عظمى عند رأس المنحنى $\frac{-b}{2a}$
نحصل على أكبر مساحة عندما يكون

$$W = \frac{-b}{2a} = \frac{-140}{2(-1)} = 70 \text{ cm}$$

$$L = 140 - W$$

$$L = 140 - 70 = 70 \text{ cm}$$

وتتحقق أكبر مساحة للبرواز عندما يكون كل من طول وعرض البرواز يساوي 70 cm
وتكون أكبر مساحة: $70 \times 70 = 4900$

أي أكبر مساحة: 4900 cm^2

حاول أن تحل

- 2 (a) ما أفضل تسمية للشكل الهندسي الذي يعطي أكبر مساحة للبرواز في المثال (2)؟
(b) هل تعتقد أن هذا الشكل يعطي دائماً أكبر مساحة لشكل مستطيل محيطه معلوم؟
(c) أوجد عددين موجبين c, d على أن يكون: $c + d = 18$ و $c \times d$ أكبر ما يمكن.

لقد حولت معادلة الدالة التربيعية من الصورة العامة إلى الصورة بدلالة إحداثيات الرأس.
يمكنك أيضاً تحويل معادلة الدالة التربيعية من صورتها بدلالة إحداثيات الرأس إلى الصورة العامة.

مثال (3)

اكتب المعادلة: $y = 3(x - 1)^2 + 12$ في الصورة العامة.
الحل:

$$y = 3(x - 1)^2 + 12$$

$$y = 3(x^2 - 2x + 1) + 12$$

$$y = 3x^2 - 6x + 3 + 12$$

$$y = 3x^2 - 6x + 15$$

$$(x - 1)(x - 1)$$

استخدم خاصية التوزيع

بسط

في التمارين (13-15) لديك قائمتان، اختر من القائمة (2) ما يناسبه في القائمة (1) لتحصل على إجابة صحيحة.

القائمة (2)	القائمة (1)
(a)	الصيغ البيانية للدالة: (13) $y = x^2 + 4x + 1$ هو.
(b)	(14) $y = -x^2 - 4x + 1$ هو.
(c)	(15) $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ هو.
(d)	

(b) نلاحظ أن: $h = -\frac{b}{2}$ ، وذلك في المعادلتين الأولى والثانية.

(c) نلاحظ أن: $h = -\frac{b}{2a}$ ، وذلك في المعادلتين الثالثة والرابعة وهذا ينطبق على الحالتين في الفقرة (b)، لأن $a = 1$

ثالثًا: (a) معادلة محور التماثل هو قيمة الإحداثي السيني لرأس القطع المكافئ أي $x = -\frac{b}{2a}$

$$(b) x = -\frac{b}{2a}$$

$$(c) x = \frac{-10}{2 \times 2} = \frac{-5}{2}$$

«حاول أن تحل»

$$1 \quad y = -3x^2 + 12x + 5$$

$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{-12}{2(-3)} = 2, \quad h = 2$$


نعوض $x = 2$ بـ y فيكون $y = 17$ والمعادلة بدلالة إحداثيات الرأس هي:

$$y = -3(x - 2)^2 + 17$$

الرأس (2, 17)، محور التماثل $x = 2$

نقطة على المنحنى (4, 5) انعكاسها في محور التماثل النقطة (0, 5).

الرسم البياني:



حاول أن تحل
اكتب المعادلة: $y = -2(x + 3)^2 - 7$ في الصورة العامة وارسم بيانيها.
تعطي كل من المعادلة في الصورة بدلالة إحداثيات الرأس والصورة العامة معلومات عن الدالة ما مميزات استخدام كل صورة لرسم بيان الدالة؟

مثال (4)
منحنى الدالة $y = ax^2 + bx + 12$ له رأس عند النقطة (1, 8) فما قيم a, b ؟
الحل:
طريقة أولي:
النقطة (1, 8) تنتمي إلى منحنى الدالة
∴ بالتعويض
 $8 = a(1)^2 + b(1) + 12$
 $8 = a + b + 12$
 $a + b = -4$ (1)
 $x = -\frac{b}{2a}$
∴ $1 = -\frac{b}{2a} \Rightarrow b = -2a$ (2)
نحل النظام
 $\begin{cases} a + b = -4 \\ b = -2a \end{cases}$ (1) (2)
في (1) نعوض عن b بقيمتها في (2) فنحصل على:
 $a - 2a = -4$
 $-a = -4 \Rightarrow a = 4$
في (2) نعوض عن $a = 4$ فنحصل على: $b = -2(4) = -8$
∴ $a = 4, b = -8$
طريقة ثانية:
بالمقارنة مع الدالة المعطاة $y = ax^2 + bx + 12$
نجد أن
 $y = a(x - 1)^2 + 8$
 $= a(x^2 - 2x + 1) + 8$
 $= ax^2 - 2ax + a + 8$
 $a + 8 = 12 \Rightarrow a = 4$
 $-2a = b \Rightarrow b = -2(4) = -8$
حاول أن تحل
منحنى الدالة $y = ax^2 + 4x + c$ له رأس عند النقطة (-1, 5) فما قيم a, c ؟

2 (a) بما أن الطول = العرض = 70 cm ، فإن الشكل

الهندسي الحاصل هو مربع.

(b) عموماً إذا كان لدينا مستطيل محيطه معلوم

فمساحته العظمى تتحقق عندما يكون الطول


يساوي العرض أي مربع.

(c) مشابه لما سبق لذا يتحقق أكبر ناتج ضرب إذا

تساوى العددين أي $c = d = 9$

وبالتالي: $c \times d = 9 \times 9 = 81$

3 (a) $y = -2x^2 - 12x - 25$



(b) المعادلة بدلالة إحداثيات الرأس توفر بسرعة

إحداثيات الرأس ومحور التماثل. أما المعادلة

بالصورة العامة فتوفر بسرعة تقاطع المنحنى مع

محور الصادات ومحور التماثل $x = \frac{-b}{2a}$

4 $-1 = \frac{-4}{2a}$ ومنه نحصل على $a = 2$

$c = 7$ ومنه $5 = 2(-1)^2 + 4(-1) + c$

وتصبح المعادلة: $y = 2x^2 + 4x + 7$



تطبيقات حياتية

وجد صاحب محل بيع الأحذية الرياضية أنه يمكن نمذجة ربحه بالدالة:

$$f(x) = -15x^2 + 600x + 50$$

حيث x تمثل سعر الحذاء بالدينار.

a ما سعر الحذاء الذي يحقق أعلى ربح؟

b ما قيمة أعلى ربح؟

الحل:

a $f(x) = -15x^2 + 600x + 50$

رسمها البياني قطع مكافئ له قيمة عظمى، نتحقق القيمة العظمى عند

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-600}{2(-15)} = 20$$

أي أن ثمن الحذاء الذي يحقق أعلى ربح هو 20 ديناراً.

b $f(20) = -15(20)^2 + 600(20) + 50 = 6050$

∴ الربح الأعلى يساوي 6 050 ديناراً.

حاول أن تحل

5 لاحظ صاحب محل بيع الدراجات النارية أن بالإمكان نمذجة ربحه بالدالة:

$$f(x) = -x^2 + 2200x - 1150000$$

حيث x تمثل سعر مبيع الدراجة النارية بالدينار.

a أوجد سعر مبيع الدراجة النارية الذي يحقق أعلى ربح.

b أوجد قيمة أعلى ربح.

5 (a) $x = -\frac{b}{2a}$

$$x = \frac{-2200}{-2} = 1100$$

السعر الذي يحقق أعلى ربح = 1100 دينار

(b)

$$f(1100) = -(1100)^2 + 2200(1100) - 1150000 = 60000$$

قيمة أعلى ربح تساوي 60 000 دينار.

تعرفت سابقاً ماهية الدالة الحقيقية ومتى تكون علاقة ما دالة، واستخدمت اختبار الخط المستقيم الرأسي لتعرف إذا كان منحنى يمثل دالة حقيقية أم لا. وفي هذا الدرس، سوف توجد معكوس دالة حقيقية وتختبر ما إذا كان هذا المعكوس يمثل دالة حقيقية أم لا. وبالتالي سوف يقودنا إلى التعامل مع دوال الجذر التربيعي انطلاقاً من معرفتنا بالدوال التربيعية التي درسناها في بداية هذه الوحدة.

من المهم جداً الإشارة إلى أن الطلاب قد تعاملوا سابقاً مع المعكوسات دون معرفتهم بذلك، فمثلاً في القاعدة:

$$d = v \times t$$

أي المسافة = معدل السرعة \times الزمن

عندما نعكس المعطيات نكتب: $v = \frac{d}{t}$ أو $t = \frac{d}{v}$

أو عند استخدام قاعدة المساحة في المستطيل: $A = L \cdot W$

عندما نعكس المعطيات نكتب: $L = \frac{A}{W}$ أو $W = \frac{A}{L}$

وهذه هي الفكرة الرئيسة في فقرة «نشاط»، لذا يطلب إلى المعلم إجراء نقاش موسع مع الطلاب أثناء التعامل مع مخطط: عدد يدخل \leftarrow عدد يخرج.

في المثال التوضيحي:

ركّز انتباه الطلاب على الترابط بين العلاقة S ومعكوسها. فالزوج المرتب (x, y) في العلاقة S يصبح الزوج المرتب (y, x) في معكوس S . ساعدهم على اختبار الرسم البياني والتأكد من أن القطعة المستقيمة الواصلة بين كل نقطة تمثل (x, y) ، والنقطة التي تمثل (y, x) هي دائماً عمودية على المستقيم الذي معادلته $y = x$ أخبرهم أن هذا المستقيم هو محور انعكاس لبيان العلاقة S وبيان معكوسها.

في المثال (1)

هذا المثال له أهمية كبرى، لأنه يوفر خطوات فعّالة ومدرّسة ليتمكن الطالب من فهم التبدّل الحاصل على إحداثيات النقطة انطلاقاً من حالات خاصة. فالنقطة $(0, 4)$ سوف تصبح $(4, 0)$ ، أي كل x سوف تصبح y وكل y سوف تصبح x ونلاحظ أيضاً أن معكوس الدالة الخطية هو دالة خطية.


إذا كانت r علاقة تصل بين عنصر a من مجال r وعنصر b من مدى r فإن معكوس العلاقة r يصل من b إلى a .

إذا كان (a, b) زوج مرتب من علاقة r فإن (b, a) هو زوج مرتب من معكوس هذه العلاقة.

يبين المخطط أدناه علاقة r ومعكوسها r^{-1} .

مدى العلاقة r هو مجال معكوس هذه العلاقة ومجال r هو مدى معكوسها.

معلومة:
يعبر عن معكوس العلاقة r بالرمز r^{-1} .



مثال توضيحي

يبين الجدول المقابل علاقة S .

أوجد معكوس العلاقة S .

مثل بيان S وبيان معكوسها.

صف العلاقة بين المستقيم $y = x$ وبيان S وبيان معكوسها.


هل العلاقة S تمثل دالة؟ هل معكوس S يمثل دالة؟

الحل: أ. نلّم قيم x, y في الجدول.

x	1	2	3	4
y	-1	0	1	1

x	-1	0	1	1
y	1	2	3	4

بيان العلاقة S



بيان S وبيان معكوسها

المستقيم $y = x$ هو خط انعكاس لبيان S وبيان معكوسها.

العلاقة S تمثل دالة لأن كل عنصر من المجال يقترن بعنصر واحد فقط.

من المجال المقابل.

بينما معكوس S لا يمثل دالة لأن العنصر (1) من المجال يقترن بعنصرين.

من المجال المقابل.

المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلّل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة.

(1) إذا كانت النقطة $M(x, y)$ تنتمي لبيان الدالة f فإن النقطة $N(y, x)$ تنتمي لبيان معكوس هذه الدالة.

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

في المثال (2)

يساعد الطالب على فهم كيفية إيجاد معكوس علاقة من علاقة معطاة، حيث يمكن الاستفادة من المثال التوضيحي إذ يفترض إبدال المتغيرين x و y ويتضح عندها أن معكوس العلاقة التي تمثل مستقيماً سيكون علاقة تمثل مستقيماً ويبقى المستقيم $y = x$ هو محور انعكاس بينهما.

في المثال (3)

يواجه الطالب في هذا المثال مشكلة وهي أن الدالة التي نبحث عن معكوسها هي دالة تربيعية وبالتالي عند التحويل بين x و y سوف يواجه مشكلة إيجاد الجذر التربيعي لذا على الطالب أن يتذكر دائماً أن $a \geq 0$ ، $x^2 = a$ تعطي دائماً $x = \pm \sqrt{a}$ لذا كان السؤال: هل معكوس دالة تربيعية هو دالة؟

وبالتالي، مناقشة الحلول في هذا المثال مهمة للإجابة عن السؤال أعلاه ومن هنا كان المدخل إلى دوال الجذر التربيعي.

في المثال (4)

يمكن الإشارة إلى دوال المرجع $y = \sqrt{x}$ أو $y = -\sqrt{x}$ ورسومها البيانية وانطلاقاً منها يمكن فهم الإزاحة على الصورة: $y = \sqrt{x-h} + k$ أو $y = -\sqrt{x-h} + k$ ، حيث h, k كميتان ثابتتان.

من المهم الإشارة إلى الطلاب أن معكوس دالة الجذر التربيعي هو دالة ولكن معكوس الدالة التربيعية ليس بالضرورة دالة، حيث يلزم شروط في مجال تعريفها.

6 الربط

يوفر المثال (5) الربط بين الواقع ودالة الجذر التربيعي، حيث العلاقة بين مساحة شاشة الإعلانات وطول القطر، علماً أن شكل الشاشة هو مستطيل عموماً.

7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب فيكتبون أن معكوس الدالة التربيعية هو دالة. ذكرهم دائماً باستخدام اختبار الخط المستقيم الرأسي ليتأكدوا من عدم الوقوع في هذا الخطأ أثناء كتابتهم معكوس الدالة التربيعية.

إذا كانت النقطة (a, b) تنتمي إلى بيان دالة فإن النقطة (b, a) تنتمي إلى بيان معكوس هذه الدالة ولكي ترسم معكوس الدالة بياناً اعكس الترتيب لكل زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة.

معكوس الدالة الخطية هو دالة خطية أيضاً.

مثال (1)

ارسم بيان الدالة $y = \frac{x-4}{2}$ ومعكوسها ثم اكتب معادلة المعكوس.

الحل:

ترسم بيان الدالة الأصلية $y = \frac{x-4}{2}$ وهي دالة خطية

x	0	2	4
y	-2	-1	0

∴ تنبيان لبيان الدالة y : $(4, 0)$ ، $(0, -2)$

∴ تنبيان لبيان معكوس الدالة y وهو خط مستقيم.

ارسم المستقيم المار بالنقطتين الجديدتين:

كتابة معادلة هذا المستقيم:

الميل: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ، $(x_2, y_2) \neq (x_1, y_1)$

$$= \frac{4 - 0}{0 - (-2)} = 2$$

معادلة المستقيم المار بالنقطة $(0, 4)$ وبميله 2 هي:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = 2(x - 0)$$

$$y = 2x + 4$$

معادلة المعكوس هي: $y = 2x + 4$

حاول أن تحل

1 ارسم الدالة $y = -3x + 5$ ومعكوسها، ثم اكتب معادلة المعكوس.

طريقة أخرى لإيجاد معكوس الدالة جبرياً وهي التبديل بين متغيرات الدالة y و x ثم الحل بالنسبة إلى y إذا كانت الدالة تستخدم الرمز $f(x)$ عوضاً عن $y = f(x)$

8 التقييم

تابع عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل»، لتأكد من فهمهم لمعكوس الدالة بشكل صحيح ومن أنهم يستخدمون الإزاحة في رسم دوال الجذر التربيعي.

اختبار سريع

1 أوجد معكوس الدالة: $y = 3x - 4$

$$y = \frac{x+4}{3}$$

2 أوجد معكوس الدالة: $y = -x^2 + 4$

هل المعكوس دالة؟ اشرح.

$y = \pm \sqrt{-x+4}$ ليس دالة، لأنه توجد قيمتان

للمتغير التابع y وذلك لقيم $x \leq 4$

3 تمت إزاحة الرسم البياني للدالة: $y = \sqrt{x}$

4 وحدات إلى اليسار، 3 وحدات إلى الأعلى.

اكتب معادلة الدالة المزاحة.

$$y = \sqrt{x+4} + 3$$

9 إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

1 (a) $L = 11d - 0.5$

$$L = 11(5) - 0.5, L = 54.5 \text{ cm}$$

(b) نعوض d بقيمتها ونحل المعادلة.

2 (a) $27 = L = 11d - 0.5, d = 2.5 \text{ cm}$

(b) نعوض L بقيمتها ونحل المعادلة.

فمثلاً لإيجاد معكوس الدالة $y = \frac{x-4}{2}$ نبدل بين المتغيرات فيكون: $x = \frac{y-4}{2}$

$2x = y - 4$
 $y = 2x + 4$


مثال (2)
أوجد معكوس الدالة:
الحل:
بدل x, y
حل بالنسبة إلى y
معكوس الدالة: $y = 5x - 4$

حاول أن تحل
2 أوجد معكوس الدالة:

a $y = \frac{2x-1}{3}$ b $y = 2(x+1) - 3$

مثال (3)
أوجد معكوس الدالة: $f(x) = x^2 + 3$ وناقش الحلول.
الحل:
عز عن $f(x)$
بدل x, y
حل بالنسبة إلى y
أوجد الجذر التربيعي للطرفين
معكوس الدالة $f(x) = x^2 + 3$ هو:
 $y = \pm \sqrt{x-3}$
الرسم البياني للدالة: $y = x^2 + 3$ ومعكوسها:
 $y = \pm \sqrt{x-3}$ موضح إلى اليسار،
وكما ترى فإن معكوس الدالة ربما لا يكون دالة.
ومعكوس القطع المكافئ الممثل بالدالة:
 $y = x^2 + 3$ هو قطع مكافئ مفتوح لليمين،
وهو ليس دالة لأنه توجد قيمتان لـ y لبعض قيم x .

1 (a)



(b) (3, -2)

(4, 0)

(5, 2)


(c) (-2, 3), (0, 4), (2, 5)

ينعكس ترتيب كل زوج مركب.

«حاول أن تحل»

1 معكوس: $y = -3x + 5$

هو $y = \frac{-x + 5}{3}$



مناقشة الحلول:

a. ما معادلة المعكوس للدالة: $y = x^2 + 3$ عند $x \geq 0$ ؟
b. هل المعكوس دالة؟ نعم
c. ما معادلة المعكوس للدالة: $y = x^2 + 3$ عند $x \leq 0$ ؟
d. هل المعكوس دالة؟ نعم

حاول أن تحل

3. أوجد معكوس الدالة: $f(x) = (x + 3)^2 - 4$. ناقش الحلول.

Square Root Functions

دوال الجذر التربيعي

المعادلة $y = \sqrt{x}$ دالة جذر تربيعي. الشكل المرسوم يمثل بيان هذه الدالة ويبدأ من (0, 0)، حيث إن الدالة معرفة فقط بالنسبة إلى صفر وإلى القيم الموجبة لـ x . أي أنها معرفة عندما $x \geq 0$.

فيكون مجالها $[0, \infty)$ ، والمداى هو $y \geq 0$ لأن y وهي قيم الدالة عند المجال المعطى.

التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي $y = \sqrt{x - h} + k$

ينتج من إزاحة لبيان دالة المرجع $y = \sqrt{x}$ كالتالي:


■ عندما تكون h موجبتين فإن الإزاحة تكون h من الوحدات يمينًا

وعدد k من الوحدات إلى الأعلى.

■ وعندما تكون h سالبة يزاح البيان إلى اليسار.

■ وعندما تكون k سالبة يزاح البيان إلى الأسفل.

فمثلًا بيان الدالة: $y = \sqrt{x - 4} - 2$ أو $y = \sqrt{x - (-3)} - 4$ ينتج من إزاحة بيان الدالة $y = \sqrt{x}$ ثلاث وحدات إلى اليسار وأربع وحدات إلى الأسفل.



مثال (4)

ارسم الدالة: $y = \sqrt{x - 4} - 2$ ، وعين المجال والمداى للدالة.

الحل:


أزح بيان دالة المرجع: $y = \sqrt{x}$

4 وحدات يمينًا وحدة إلى الأسفل.

يبدأ بيان الدالة $y = \sqrt{x - 4} - 2$ عند النقطة (4, -2)

ويبين الرسم البياني لها أن المجال $[4, \infty)$

والمداى $[-2, \infty)$



حاول أن تحل

4 ارسـم بيانيًا: $y = \sqrt{x-2} + 1$

عـتـن المـجـال والمـدى للـدالة.

ب إذا تم إزاحة بيان الدالة: $y = \sqrt{x}$ ، 5 وحدات يمينًا و 2 وحدة إلى الأسفل. اكتب معادلة الدالة الناتجة عن الإزاحة.

يمكنك استخدام دالة الجذر التربيعي لتمثيل مواقف حياتية.

مثال (5) الصلة بالواقع

مقاس شاشة إعلانات هو طول قطر الشاشة، d ، بال بوصة (in).

المعادلة: $d = \sqrt{2A}$ ، تقدر طول قطر شاشة إعلانات بالمساحة A .

لفرض أن تاجرًا يريد شراء شاشة إعلانات مساحتها ضعف مساحة شاشته القديمة التي مساحتها 100 in^2 ، فما مقاس الشاشة التي يجب أن يشتريها؟

الحل:

مساحة الشاشة الجديدة $2 \times 100 \text{ in}^2$ أو 200 in^2 .

الطريقة الأولى: استخدام التعويض

استخدام دالة الجذر التربيعي

عوض بـ 200 عن A

يجب أن يشتري شاشة 20 in

الطريقة الثانية: الربط بالكمبيوتر (إثباتي)

استخدام الآلة الحاسبة البيانية.

أدخل $y = \sqrt{2x}$.

اقرأ قيمة y عند $x = 200$

يجب أن يشتري شاشة 20 in

ملاحظة: $1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$

حاول أن تحل

5 إذا كان لدى تاجر شاشة إعلانات قياسها 42 in (طول القطر 42 in).

فما هي مساحة الشاشة علماً بأن المعادلة: $d = \sqrt{2A}$ تحدد العلاقة بين طول القطر d والمساحة A لشاشة الإعلانات؟

2 (a) $y = \frac{3x+1}{2}$

(b) $y = \frac{x+1}{2}$

3 $y = (x+3)^2 - 4$

لإيجاد المعكوس نبدل بين x, y


$x = (y+3)^2 - 4$ ومنه $y = -3 \pm \sqrt{x+4}$

فيكون لدينا دالتان:

$y_1 = -3 + \sqrt{x+4}$


$y_2 = -3 - \sqrt{x+4}$

انظر الرسم البياني:



4 (a) $y = \sqrt{x-2} + 1$

المجال: $x \geq 2$ ، المدى: $y \geq 1$



(b) المعادلة الناتجة عن الإزاحة: $y = \sqrt{x-5} - 2$

5 مساحة الشاشة: 882 in^2

6-2: حل المتباينات

1 الأهداف

- يحل متباينات من الدرجة الثانية في متغير واحد.
- يحل متباينات تتضمن حدوديات نسبية في متغير واحد.
- يوجد مجال دالة جذرية.

2 المفردات والمفاهيم الجديدة

متباينة - حدوديات نسبية - متباينة من الدرجة الثانية.

3 الأدوات والوسائل

مسطرة - آلة حاسبة - ورق رسم بياني - جهاز إسقاط (Data Show) - حاسوب .

4 التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

- (a) أوجد مجموعة حل المتباينة: $2x + 7 < 0$
- (b) أوجد مجموعة حل المتباينة: $-3x + 4 \leq 7$
- (c) حلل المقدار: $x^2 - 5x + 6$ إلى عوامل خطية.


5 التدريس

تعرفت سابقًا إلى حلول المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد، ومثلت مجموعة الحلول على خط الأعداد. في هذا الدرس، سوف نتعرف حلول متباينات من الدرجة الثانية في متغير واحد فقط وأيضًا حلول متباينات ذات حدوديات نسبية بأشكال بسيطة. وهذه الحلول سوف تكون جبرية وبيانية لذا من المهم جدًا الربط في ما بينها. فالحلول البيانية للمتباينة تساعد الطالب على فهم المتغير التابع y وعلاقته بالمتغير المستقل x .

2-6

حل المتباينات

Solving Inequalities



عمل تعاوني

أولاً: يبين الرسم البياني المقابل (1) منحنى $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ ومن الرسم أوجد:

- a) قيم x حيث $f(x) = 0$
- b) قيم x حيث $f(x) > 0$
- c) قيم x حيث $f(x) < 0$

ثانياً: يبين الرسم البياني المقابل (2) للدالة $f(x) = \frac{x-3}{x-2}$ أجب عن الأسئلة a, b, c.

سوف نتعلم

- حل متباينات من الدرجة الثانية في متغير واحد.
- حل متباينات تتضمن حدوديات نسبية في متغير واحد.
- إيجاد مجال دالة جذرية.

المفردات والمصطلحات

- متباينة Inequality
- حدوديات نسبية Rational Expressions
- متباينة من الدرجة الثانية Quadratic Inequality

من العمل التعاوني السابق يمكننا أن نعرف عن اتحاد مجموعتي القيم $(-\infty, 1) \cup (5, \infty)$ بصورة أخرى وهي $R \setminus [1, 5]$.

يبين الجدول التالي كيفية كتابة اتحاد فترتين بصورة أخرى في بعض الحالات.

تمثيل الفترة على خط الأعداد	صورة أخرى لرمز الفترة	رمز الفترة
$\leftarrow \dots \circ \dots \circ \rightarrow$ $a \quad b$	$R \setminus [a, b]$	$(-\infty, a) \cup (b, \infty)$
$\leftarrow \dots \circ \dots \bullet \rightarrow$ $a \quad b$	$R \setminus (a, b]$	$(-\infty, a] \cup (b, \infty)$
$\leftarrow \dots \bullet \dots \bullet \rightarrow$ $a \quad b$	$R \setminus [a, b)$	$(-\infty, a) \cup [b, \infty)$
$\leftarrow \dots \bullet \dots \circ \rightarrow$ $a \quad b$	$R \setminus (a, b)$	$(-\infty, a] \cup [b, \infty)$

مثال (1)

أوجد مجموعة حل المتباينة: $x^2 - x - 6 < 0$

الحل:

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x+2)(x-3) = 0$$

المعادلة المناظرة

نحلل

تذكر:

إذا كان $a > b$ فإن $a = 0$ و $b = 0$

75

$$x+2=0 \Rightarrow x=-2$$

$$x-3=0 \Rightarrow x=3$$

لنبحث عن قيم x التي تحقق $(x+2)(x-3) < 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l|l} x+2 < 0 \Rightarrow x < -2 & x-3 < 0 \Rightarrow x < 3 \\ x+2 > 0 \Rightarrow x > -2 & x-3 > 0 \Rightarrow x > 3 \end{array}$$

تكون الجدول:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x+2$	-	0	+	+
$x-3$	-	-	0	+
$(x+2)(x-3)$	+	0	-	+

يبين الجدول أن $(x+2)(x-3) < 0$ لكل قيم x حيث $-2 < x < 3$.
مجموعة الحل: $(-2, 3)$.

حاول أن تحل

أوجد مجموعة حل المتباينة: $x^2 + 4x + 3 \leq 0$.

مثال (2)

أوجد مجموعة حل المتباينة: $-x^2 + 7x - 10 \leq 0$

الحل:

$$-x^2 + 7x - 10 \leq 0$$

$$x^2 - 7x + 10 \geq 0$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x^2 - 7x + 10 = (x-2)(x-5)$$

$$x-2=0 \Rightarrow x=2$$

$$x-5=0 \Rightarrow x=5$$

لنبحث عن قيم x التي تحقق: $(x-2)(x-5) \geq 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l|l} x-2 < 0 \Rightarrow x < 2 & x-5 < 0 \Rightarrow x < 5 \\ x-2 > 0 \Rightarrow x > 2 & x-5 > 0 \Rightarrow x > 5 \end{array}$$

تذكر:

عدد ضرب طرفي متباينة في عدد سالب يعكس علاقة الترتيب.

76

في المثالين (1)، (2)

نلاحظ أن تحليل المقدار إلى عوامل خطية، ثم إيجاد مجموعة الحلول لكل عامل استناداً إلى ما تعلمه الطالب في مرحلة سابقة، ثم التعبير عن مجموعة حل المتباينة كل عامل بجدول يساعد على إيجاد مجموعة حل المتباينة من الدرجة الثانية.

في المثال (3)

يمكن استخدام هذا المثال في مواقف حياتية يحتاج إليها الأشخاص إذا كان لديهم شروط محددة في الإنشاءات والبناء.

في المثالين (4)، (5)

يساعدان كثيراً على فهم كيفية إيجاد مجموعة الحل عندما يكون لدينا متباينات من حدوديات نسبية. وذلك باستخدام الجدول لكل من حدوديات البسط والمقام.

في المثالين (6)، (7)

يعالجان إشكالية العامل المشترك بين البسط والمقام في المتباينة الحدودية النسبية وهذا مهم جداً. ركز انتباه الطلاب إلى قيمة المتغير x عند تبسيط الحدودية النسبية، حيث لا يصح التبسيط مع العدد صفر.

في المثال (8)

من المهم جداً التركيز على طريقة إيجاد مجموعة الحل في استخدام الرسم البياني.

راجع مع الطلاب مجموعة الحل في فقرة «عمل تعاوني». أعط أمثلة مشابهة، ومن ثم يمكن الانتقال إلى إيجاد مجموعة الحل لمتباينات تربط بين دالتين $f(x)$ ، $g(x)$

6 الربط

يمكن تعميم فكرة المثال (3) لاستخدامها في إقامة سور من الشريط الشائك حول مساحة من الأرض مستطيلة الشكل ومحاولة إيجاد طول هذه الحديقة وعرضها.

7 أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في المتباينة ذات الحدوديات النسبية فيستخدمون الضرب التقاطعي.

أرشدتهم إلى الطريقة الصحيحة وأخبرهم أن ذلك لا يصح إلا في المعادلة.

وقد يخطئ الطلاب في استبعاد أصفار المقام من مجموعة الحل. أرشدتهم إلى تأكيد استبعادها بعد الاختصار.

تكون الجدول:

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$x-2$	-	0	+	+
$x-5$	-	-	0	+
$(x-2)(x-5)$	+	0	-	+

يبين الجدول أن $(x-2)(x-5) \geq 0$ لكل قيم x حيث $x \leq 2$ أو $x \geq 5$.
 \therefore مجموعة الحل = $(-\infty, 2] \cup [5, +\infty)$
 أو $R \setminus (2, 5)$

حاول أن تحل

2. أوجد مجموعة قيم x التي تحقق المتباينة: $-2x^2 + 5x - 3 > 0$.

تذكر:

يمكنك ضرب طرفي المتباينة في (-1) لتسهيل.

مثال (3) تطبيقات حياتية

صمم مهندس مخططاً لحديقة منزل على شكل مستطيل طول أحد بعديها x ومحيطها 20 m. ما المجال الواقعي للمتغير x ؟



$$P = 2(L + W) = 20 \text{ m}$$

$$L + W = \frac{20}{2} = 10 \text{ m}$$

إذا اعتبرنا أحد البعدين يساوي x ، البعد الآخر $10 - x$.
 \therefore المجال الواقعي للمتغير هو: $0 < x < 10$
 $x \in (0, 10)$

المساحة = الطول \times العرض

$$f(x) = L \times W$$

$$f(x) = x(10 - x) = -x^2 + 10x$$

$$f(x) < 24$$

$$-x^2 + 10x < 24 \Rightarrow -x^2 + 10x - 24 < 0$$

المعادلة المناظرة

حل

$$-x^2 + 10x - 24 = 0$$

$$(-x + 4)(x - 6) = 0$$

$$x - 6 = 0 \quad \text{أو} \quad -x + 4 = 0$$

$$\therefore x = 6 \quad \therefore x = 4$$

لايجاد قيم x التي تحقق $(-x + 4)(x - 6) < 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l} -x + 4 < 0 \Rightarrow x > 4 \\ -x + 4 > 0 \Rightarrow x < 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} x - 6 < 0 \Rightarrow x < 6 \\ x - 6 > 0 \Rightarrow x > 6 \end{array}$$

تكون الجدول مع مراعاة $x \in (0, 10)$

x	0	4	6	10
$-x + 4$	-	+	-	-
$x - 6$	-	-	+	+
$(-x + 4)(x - 6)$	-	0	+	-

من الجدول: مجموعة الحل = $(0, 4) \cup (6, 10)$

d $f(x) > 9$

$$-x^2 + 10x > 9 \Rightarrow -x^2 + 10x - 9 > 0$$

$$-x^2 + 10x - 9 = 0$$

$$(-x + 1)(x - 9) = 0$$

$$x - 9 = 0 \quad \text{أو} \quad -x + 1 = 0$$

$$\therefore x = 9$$

نضع التالي:

لايجاد قيم x التي تحقق $(-x + 1)(x - 9) > 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l} -x + 1 < 0 \Rightarrow x > 1 \\ -x + 1 > 0 \Rightarrow x < 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x - 9 < 0 \Rightarrow x < 9 \\ x - 9 > 0 \Rightarrow x > 9 \end{array}$$

تكون الجدول مع مراعاة $x \in (0, 10)$

x	0	1	9	10
$-x + 1$	-	+	-	-
$x - 9$	-	-	+	+
$(-x + 1)(x - 9)$	-	0	+	-

من الجدول: مجموعة الحل = $(1, 9)$

8 التقييم

تابع باهتمام أعمال الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لتتأكد من أنهم يجدون مجموعة الحلول الصحيحة في كل متباينة. ساعدهم على فهم الحلول في الرسوم البيانية.

اختبار سريع

1 أوجد مجموعة حل المتباينة: $-x^2 + 4x + 5 \geq 0$

$$x \in [-1, 5]$$

2 لتكن x عرض مستطيل محيطه يساوي 30 m

أوجد مساحة هذا المستطيل بدلالة x ، ثم قيم x التي تحقق $f(x) \geq 14$

$$\text{نصف المحيط: } \frac{30}{2} = 15$$

$$\text{الطول: } x - 15, \text{ حيث } x \in (0, 15)$$

$$\text{المساحة: } f(x) = x(15 - x) = -x^2 + 15x$$

$$-x^2 + 15x - 14 \geq 0 \text{ تعطي: } f(x) \geq 14$$

$$\text{نستنتج أن: } x \in [1, 14]$$

3 أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{4x+3}{x-2} \geq 3$

$$\text{حيث } x \neq 2$$

$$x \in (-\infty, -9] \cup (2, +\infty)$$

9 إجابات وحلول

«عمل تعاوني»

أولاً:

(a) $x = 1, x = 5$

(b) $x < x < 5$

(c) $x < 1$ أو $x > 5$

ثانياً: (a) $f(x) = 0$ عند $x = 3$

(b) $f(x) > 0$ إذا $x > 3$ أو $x < 2$

(c) $f(x) < 0$ إذا $2 < x < 3$

حاول أن تحل

- 3 إذا كان محيط مستطيل يساوي 16 m وكان x طول أحد بعديه.
 a ما المجال الواقعي للمتغير x ?
 b إذا اعتبرنا f دالة مساحة المستطيل لغير عرضها بدلالة x .
 c ما مجموعة حل المتباينة $f(x) > 7$ ؟

مثال (4) تطبيق على مجال الدالة

أوجد مجال كل دالة مما يلي:

- a $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
 b $g(x) = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$

الحل:

a $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

$$x^2 - 4 \geq 0$$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$x = 2 \text{ أو } x = -2$$

مجال الدالة f هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق الشرط
 نوجد المعادلة المناظرة

حل

لايجاد قيم x التي تحقق: $(x - 2)(x + 2) \geq 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l|l} x - 2 < 0 \Rightarrow x < 2 & x + 2 < 0 \Rightarrow x < -2 \\ x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2 & x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2 \end{array}$$

تكون الجدول:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$x - 2$	-	-	0	+
$x + 2$	-	0	+	+
$(x - 2)(x + 2)$	+	0	-	+

$$\text{مجال الدالة } f \text{ هو: } (-\infty, -2] \cup [2, +\infty) \\ = \mathbb{R} \setminus (-2, 2)$$

79

1 $g(x) = \sqrt{-x^2 + 4x - 3}$

الحل:

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0$$

$$-x^2 + 4x - 3 = 0$$

$$(-x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x = 1 \text{ أو } x = 3$$

مجال الدالة g هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق الشرط

المعادلة المناظرة

تحليل إلى عوامل

الأصغر

لايجاد قيم x التي تحقق: $(-x + 1)(x - 3) \geq 0$ نضع التالي:

$$\begin{array}{l|l} -x + 1 < 0 \Rightarrow x > 1 & x - 3 < 0 \Rightarrow x < 3 \\ -x + 1 > 0 \Rightarrow x < 1 & x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3 \end{array}$$

تكون الجدول:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$-x + 1$	+	0	-	-
$x - 3$	-	-	0	+
$(-x + 1)(x - 3)$	-	0	+	-

مجال الدالة g هو: $[1, 3]$

حاول أن تحل

- 4 هل يمكنك إيجاد مجال الدالة $y = \sqrt{x^2 - 4}$ بطريقة أخرى.
 a أوجد مجال كل دالة مما يلي:

1 $h(x) = \sqrt{x^2 - x}$

2 $q(x) = \sqrt{9 - x^2}$

80

«حاول أن تحل»

1 $[-3, -1]$

2 $(1, 1.5)$

3 (a) نصف المحيط: $\frac{16}{2} = 8$

$8 - x =$ عرض المستطيل أي $8 - x > 0$ ومنه
 $0 < x < 8$

(b) $f(x) = x(8 - x)$

(c) $f(x) > 7$ تعطي $x(8 - x) > 7$

$-x^2 + 8x - 7 > 0 \Rightarrow 1 < x < 7$

4 (a) نعم، باستخدام متباينة المطلق كالتالي:

$x^2 - 4 \geq 0$

$x^2 \geq 4$

$|x| \geq 2$

$x \geq 2$ أو $x \leq -2$

∴ مجال الدالة هو: $R \setminus (-2, 2)$

(b) (1) $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$

(2) $[-3, 3]$

5 $\frac{3}{2} < x \leq \frac{5}{3}$

مثال (5)
أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{3x+7}{x+2} \geq 2$
الحل:
 $\frac{3x+7}{x+2} \geq 2$
 $\frac{3x+7}{x+2} - 2 \geq 0$
 $\frac{3x+7-2x-4}{x+2} \geq 0$
 $\frac{x+3}{x+2} \geq 0$
أصناف البسط: $x+3=0 \Rightarrow x=-3$
أصناف المقام: $x+2=0 \Rightarrow x=-2$
لايجاد قيم x التي تحقق $\frac{x+3}{x+2} \geq 0$ نضع التالي:
 $x+3 < 0 \Rightarrow x < -3$ | $x+2 < 0 \Rightarrow x < -2$
 $x+3 > 0 \Rightarrow x > -3$ | $x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$
نكون الجدول:

x	$-\infty$	-3	-2	$+\infty$
$x+3$	-	0	+	+
$x+2$	-	-	0	+
$\frac{x+3}{x+2}$	+	0	-	+

مجموعة الحل: $(-\infty, -3] \cup (-2, \infty)$
 $= R \setminus (-3, -2)$
حاول أن تحل
أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{3x-5}{-2x+3} \geq 0$

نذكر:
الحدوديات النسبية غير معرفة عند أصناف المقام

مقام مشترك

نكون الجدول:

مجموعة الحل:

حاول أن تحل

أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{3x-5}{-2x+3} \geq 0$

مثال (6)
أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{x^2-5x+3}{x+4} < 3$
الحل:
 $\frac{x^2-5x+3}{x+4} < 3$
 $\frac{x^2-5x+3}{x+4} - 3 < 0$
 $\frac{x^2-5x+3-3x-12}{x+4} < 0$
 $\frac{x^2-8x-9}{x+4} < 0$
أصناف البسط: $(x+1)(x-9) < 0$
أصناف المقام: $x+4=0 \Rightarrow x=-4$
لايجاد قيم x التي تحقق $\frac{(x+1)(x-9)}{x+4} < 0$ نضع التالي:
 $x+4 < 0 \Rightarrow x < -4$ | $x-9 < 0 \Rightarrow x < 9$ | $x+1 < 0 \Rightarrow x < -1$
 $x+4 > 0 \Rightarrow x > -4$ | $x-9 > 0 \Rightarrow x > 9$ | $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$
نكون الجدول:

x	$-\infty$	-4	-1	9	$+\infty$
$x+1$	-	-	0	+	+
$x-9$	-	-	-	0	+
$x+4$	-	0	+	+	+
$\frac{(x+1)(x-9)}{x+4}$	-	+	0	-	+

مجموعة حل المتباينة: $(-\infty, -4) \cup (-1, 9)$
حاول أن تحل
أوجد مجموعة حل المتباينة: $\frac{x^2+5x}{x+3} > -2$

نذكر:
من المهم جدًا تحديد أصناف المقام قبل الاختصار.

$$6 \quad \frac{(x+1)(x+6)}{(x+3)} > 0$$

x	$-\infty$	-6	-3	-1	∞
$x+1$	-	-	-	•	+
$x+6$	-	•	+	+	+
$x+3$	-	-	•	+	+
$\frac{(x+1)(x+6)}{(x+3)}$	-	+	-	+	+

∴ مجموعة حل المتباينة $(-6, -3) \cup (-1, \infty)$

$$7 \quad \frac{(x-7)(x+7)}{x+7} < 0$$

يمكن تبسيط الحدودية النسبية إذا كان العامل $x+7 \neq 0$

فيصبح $x \neq -7$ ومنه $x-7 < 0 \Rightarrow x < 7$

لذا مجموعة الحل: $(-\infty, -7) \cup (-7, 7)$

مثال (7)

أوجد مجموعة حل المتباينة $\frac{x^2-5x+6}{x-3} > 0$

الحل:

تحليل البسط: $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$

تكسب المتباينة: $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)} > 0$

قبل التبسيط نحدد أصفار المقام: $x-3=0 \Rightarrow x=3$

تبسط المتباينة: $\frac{(x-2)(\cancel{x-3})}{(\cancel{x-3})} > 0 \Rightarrow x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$

القيمة $x=3$ غير مقبولة لأنها صفر المقام

مجموعة الحل: $(2, \infty) \setminus \{3\} = (2, 3) \cup (3, \infty)$

حاول أن تحل: $\frac{x^2-49}{x+7} \leq 0$

مثال (8)

تطبيق على الرسم البياني

بين الرسم البياني منحنى الدالة: $f(x) = x^2 + 2x - 3$

أدرس بيانياً المتباينة $f(x) < 5$

أدرس بيانياً المتباينة $f(x) > 5$

تحقق حسابياً من النتائج التي حصلت عليها في (أ) و (ب)

الحل:

في الشكل يقطع المستقيم $y=5$ منحنى الدالة f في النقطتين $(-4, 5)$ و $(2, 5)$

نلاحظ أن:

أ) $f(x) < 5 \quad \forall x \in (-4, 2)$

ب) $f(x) > 5 \quad \forall x \in (-\infty, -4) \cup (2, \infty)$

نضع:

المعادلة المناظرة

لايجاد قيم x التي تحقق $(x-2)(x+4) < 0$ نتبع التالي:

83

تمرن
2-6

حل المتباينات Solving Inequalities

المجموعة A تمارين مقالية

- (1) أوجد مجموعة حل كل من المتباينات التالية:
- (a) $(x-3)(2x+5) < 0$ (b) $2x^2-3x-5 \geq 0$ (c) $-3x^2+2x < -1$
- (d) $4x^2+12x+9 \geq 0$ (e) $-9x^2+6x < 1$ (f) $21+4x > x^2$
- (2) لتعتبر عرض مستطيل $(x-2)$ cm وطوله $2x$ cm
- (a) وضح لماذا يجب أن تكون قيمة x أكبر من 2
- (b) اكتب المعادلة التي تعطي مساحة هذا المستطيل
- (c) علماً أن x عدد صحيح، أوجد قيمة x لتكون مساحة المستطيل بين 90 cm^2 و 100 cm^2 ، ثم استنتج طول المستطيل وعرضه
- في التمارين (3-9)، حل المتباينات التالية:
- (3) $\frac{x-1}{x^2-4} < 0$ (4) $\frac{x^2-1}{x^2+1} \leq 0$ (5) $\frac{x^2+x-12}{x^2-4x+4} > 0$
- (6) $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-3} \leq 0$ (7) $\frac{1}{x+2} - \frac{2}{x-1} > 0$ (8) $\frac{x}{x+1} + \frac{2}{x-1} \geq 0$
- * (9) $\frac{2x+1}{x} + \frac{3x}{1-2x} \leq 0$
- (10) عمر جد أحمد يساوي 8 أضعاف عمر أحمد. بعد 3 سنوات، سيتخطى تربع عمر أحمد ضعف عمر جدّه (للمرة الأولى). أوجد عمر أحمد وعمر جدّه الآن.
- (11) لتعتبر معادلة المستقيم $(d): y = -1$ ، أوجد بيانياً الحل لـ $f(x) < y$ ، $f(x) > y$ ، $f(x) = y$ في كل من الحالات التالية:
- (a) $f(x) = 2x^2 + 4x - 1$ (b) $f(x) = x^2 + 1$ (c) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$
- (12) لتعتبر معادلة المستقيم $(d): y = 2$ ، أوجد بيانياً الحل لـ $f(x) \geq y$ ، $f(x) < y$ ، $f(x) = y$ في كل من الحالتين التاليتين:
- (a) $f(x) = 3x^2 + 2$ (b) $f(x) = x^2 - x - 2$

32

8 يقطع المستقيم $x = -3$ منحنى الدالة:

$f(x) = x^2 - 6x + 5$ في نقطتين، حيث الإحداثيات

السينية $x = 2$, $x = 4$

$f(x) < y$ ، إذا كانت $2 < x < 4$

$f(x) \geq y$ ، إذا كانت $x \leq 2$ أو $x \geq 4$

نكون الجدول:

x	$-\infty$	-4	2	$+\infty$
$x+4$	$-$	0	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	0	$+$
$(x-2)(x+4)$	$+$	0	$-$	$+$

من الجدول نستنتج:

$f(x) < 5 \quad \forall x \in (-4, 2)$
 $f(x) > 5 \quad \forall x \in (-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$

حاول أن تحل

بين الرسم البياني منحنى الدالة:

$f(x) = x^2 - 6x + 5$ والمستقيم $y = -3$

ادرس بيانياً: $f(x) = y$, $f(x) < y$, $f(x) \geq y$

84

المجموعة B تمارين موضوعية

في التمارين (1-5)، ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة و (b) إذا كانت العبارة خاطئة:

- (1) مجموعة حل المتباينة $(x+3)^2 > 0$ هي \mathbb{R} (a) (b)
 (2) كل x ينتمي للفترة $(0, \infty)$ هو حل للمتباينة $\frac{x-1}{x^2-x} \geq 0$ (a) (b)
 (3) مجموعة حل المتباينة $(x+3)^2 + 2 < 1$ هي المجموعة الخالية \emptyset (a) (b)
 (4) مجموعة حل المتباينة $\frac{x+2}{x+1} \geq 1$ هي $(-1, \infty)$ (a) (b)
 (5) مجموعة حل المتباينة $(-x-3)^2 < 0$ هي $\{3\}$ (a) (b)

في التمارين (6-13)، ظلل رمز الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة:

- (6) المعادلة المناظرة للمتباينة $\frac{1}{x} \leq 2$ هي: (a) $-3(x+1)$ (b) $x^2 + \frac{4}{3}x + 1 = 0$ (c) $-3x^2 + 4x - 3 = 0$ (d) $-3x^2 + 2x + 1 = 0$

(7) إن مجموعة حل المتباينة $(1-2x)(4+5x) < 0$ هي:

- (a) $(-\frac{4}{5}, \frac{1}{2})$ (b) $(-\infty, -\frac{4}{5}) \cup (\frac{1}{2}, \infty)$
 (c) $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{4}{5}, \infty)$ (d) $(-\infty, -\frac{4}{5}) \cup (-\frac{1}{2}, \infty)$

(8) إن مجموعة حل المتباينة $\frac{(x^2+1)(x-3)}{x-3} > 0$ هي:

- (a) \mathbb{R} (b) \mathbb{R}^* (c) $\mathbb{R} - \{3\}$ (d) $\mathbb{R} - \{0, 3\}$

(9) المتباينة التي مجموعة حلها $[-2, 3]$ هي:

- (a) $x^2 - x - 6 < 0$ (b) $x^2 - x - 6 \leq 0$ (c) $x^2 - x - 6 > 0$ (d) $x^2 - x - 6 \geq 0$

(10) مجموعة حل المتباينة $x^2 + |x| > 0$ هي:

- (a) \mathbb{R} (b) $(0, \infty)$ (c) $\mathbb{R} - \{0\}$ (d) ليس أياً مما سبق صحيحاً

(11) إذا كانت $f(x) = \frac{x(x+1)}{(2x-3)(3x+2)}$ فإن قيم x التي تجعل f غير معرفة هي:

- (a) $\{\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}\}$ (b) $\{-\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\}$ (c) $\{\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\}$ (d) $\{-\frac{2}{3}, -\frac{3}{2}\}$

(12) مجموعة حل المعادلة $x^2 + |x| - 2 = 0$ هي:

- (a) $\{1, -2\}$ (b) $\{-1, 2\}$ (c) $\{-1, 1\}$ (d) $\{-2, 2\}$

(13) إذا كانت $f(x) = -3x^2 + x - \frac{1}{12}$ فإن قيم x التي تجعل $f(x)$ غير موجبة ولا تساوي الصفر هي:

- (a) $(-\infty, 0)$ (b) $(0, \infty)$ (c) $\{\frac{1}{6}\}$ (d) $\mathbb{R} - \{\frac{1}{6}\}$

33

المرشد لحل المسائل

إجابات «مسائل إضافية»

$$1 \quad \frac{300}{x} + \frac{300}{x-20} = 7.5$$

سيكون معدل سرعته ذهاباً 91 km/h تقريباً ومعدل سرعته إياباً 71 km/h تقريباً.

$$2 \quad (a) \quad f(100) = -(100)^2 + 250(100) - 2400$$

فيكون ربحه 12 600

(b)

$$f(x) = -(x^2 - 250x + 15625 - 15625) - 2400$$

$$f(x) = -(x - 125)^2 + 13225$$

يجب أن يبيع الحاسوب بمبلغ 125 ديناراً.

(c) أكبر ربح هو 13 225 ديناراً.

المرشد لحل المسائل

المسافة بين المدينة A والمدينة B على الطريق السريع هي 300 km. قاد خالد سيارته من المدينة A باتجاه المدينة B بمعدل سرعة x km/h، وفي طريق العودة من المدينة B إلى المدينة A، كان معدل سرعته $(x - 20)$ km/h.



استغرقت هذه الرحلة 30 min 5 h. أوجد معدل سرعة السيارة ذهاباً وإياباً.

كيف يمكنك حل هذه المسألة؟

أنا أعرف أن المسافة = الزمن × معدل السرعة.

لدي معدل السرعة x في الذهاب، ثم $x - 20$ في العودة.

أنا أعرف أن مجموع الزمن المستغرق هو 5 h 30 min، ويمكن تحويلها إلى 5.5.

أنا أعرف المسافة بين المدينتين 300 km باستخدام القاعدة أكتب،

$$\frac{300}{x} + \frac{300}{x-20} = 5.5$$

$$5.5x^2 - 710x + 6000 = 0$$

$$1.1x^2 - 142x + 1200 = 0$$

$$x^2 - \frac{142}{1.1}x + \frac{1200}{1.1} = 0$$

$$\left(x - \frac{71}{1.1} - \frac{61}{1.1}\right)^2 - \frac{3721}{1.21} = 0$$

$$\left(x - \frac{71}{1.1} - \frac{61}{1.1}\right)\left(x - \frac{71}{1.1} + \frac{61}{1.1}\right) = 0$$

المسافة = الزمن × معدل السرعة

المقام المشترك

بالتبسيط

أحلل المعادلة التربيعية إلى عوامل أولية.

بالقسمة على 1.1

المربع الكامل

التحليل

ومنه أحصل على قيمة مقبولة $x = 120$.

أي أن معدل سرعة خالد في الذهاب هو 120 km/h، ومعدل سرعته في العودة 100 km/h.

مسائل إضافية

1 كم سيكون معدل سرعة السيارة إذا أراد خالد أن تكون مدة الرحلة المستغرقة 7 h 30 min؟

2 يبيع أحد المحلات الحواسيب، وقد لاحظ أن ربحه يمكن نمذجته بالمعادلة:

$$f(x) = -x^2 + 250x - 2400$$

حيث x ثمن الحاسوب الواحد بالدينار الكويتي.

a إذا باع الحاسوب الواحد بسعر 100 دينار، فما هو ربحه؟

b إذا أراد البائع تحقيق أكبر ربح، فيكم سوف يبيع الحاسوب الواحد؟

c ما قيمة أكبر ربح؟

ملخص

- تكون العلاقة دالة إذا كان كل عنصر (عدد) في المجال مرتبطاً بعنصر (عدد) واحد فقط من المدى.
- كل دالة التي مجالها ومجالها المقابل مجموعتان جزئيتان من الأعداد الحقيقية تسمى دالة حقيقية.
- تكتب الدالة التربيعية على الصورة: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.
- يمكن كتابة بعض البيانات على الصورة الخطية: $y = ax + b$ أو على الصورة التربيعية.
- مجال الدالة هو الجزء من الأعداد الحقيقية أو كل الأعداد الحقيقية حيث يوجد المتغير x لتكون $f(x)$ معرفة.
- المدى للدالة $f(x)$ هو الجزء من الأعداد الحقيقية أو كل الأعداد الحقيقية حيث $f(x)$ موجودة.
- القيمة الصغرى للدالة التربيعية هي أصغر قيمة للدالة $f(x)$ على محور الصادات.
- القيمة العظمى للدالة التربيعية هي أكبر قيمة للدالة $f(x)$ على محور الصادات.
- يمكن رسم القطع المكافئ إذا كان على الصورة: $y = a(x - h)^2 + k$ ، حيث (h, k) إحداثيات الرأس.
- يمكن إيجاد الصورة العامة $f(x) = ax^2 + bx + c$ من الصورة $f(x) = a(x - h)^2 + k$ وبالعكس أيضاً.
- يمكن إيجاد معكوس الدوال الخطية والتربيعية بتبديل x, y .
- لإيجاد مجموعة حلول متباينة من الدرجة الثانية في متغير واحد فإننا نحلها إلى عوامل أولية ونستخدم الجدول.
- لإيجاد مجموعة حلول متباينة من حدوديات نسبية فإننا نستخدم الجدول.

مخطط تنظيمي للوحدة الثانية



اختبار الوحدة الثانية

في التمرين (1-2)، أوجد مجال كل من الدوال التالية:

(1) $f(x) = \frac{\sqrt{9x^2-4}+2}{2x-3}$

(2) $g(x) = \frac{\sqrt{-x+2}-3}{\sqrt{x^2-4}}$

(3) بيّن الجدول العلاقة بين ربيع إحدى الشركات y بالآلاف الدنانير وعدد القطع المنتجة x اكتب دالة تربيعية تمثل العلاقة بين x ، y .

x	1	2	3	4	5
y	0	-1	0	3	8

في التمرين (4-5)، ارسم كل مجموعة بيانات مما يلي، ثم اكتب معادلة كل منها:

(4)

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-1	-3	-1	5	15	29

(5)

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	1	6	13	22

في التمرين (6-7)، ارسم منحنى القطع المكافئ إذا عرفت إحداثيات الرأس ونقطة إضافية يمر بها.

(6) الرأس $A(-3, 3)$ ، $V(0, 0)$

(7) الرأس $A(2, 11)$ ، $V(1, 5)$

في التمرين (8-11)، ارسم كل دالة تربيعية. ثم حدّد إحداثيات الرأس.

(8) $f(x) = x^2 - 7$

(9) $f(x) = x^2 + 2x + 6$

(10) $f(x) = -x^2 + 5x - 3$

(11) $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 8$

في التمرين (12-15)، أوجد معكوس كل دالة مما يلي:

(12) $y = 4x + 1$

(13) $y = \frac{2}{3}x - 6$

(14) $y = x^2 - 10$

(15) $y = (x+2)^2 - 3$

(16) سؤال مفتوح: اكتب معادلة دالة، حيث منحنى معكوسها هو قطع مكافئ.

في التمرين (17-20)، اكتب كل دالة بدلالة إحداثيات الرأس. ثم ارسم منحنى القطع المكافئ وحدّد إحداثيات الرأس.


(17) $y = x^2 - 6x + 5$

(18) $y = -x^2 + 8x - 10$

(19) $y = 2x^2 - 3x + 1$

(20) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 9$

(21) أوجد أكبر مساحة لحديقة مكونة من مستطيلين لهما ضلع مشترك ويمكن إحاطتهما بشريط طوله 120 m. (انظر الصورة المقلّبة).



تمارين إثرائية

في التمرين (1-2)، أوجد مجال كل من الدوال التالية:

(1) $f(x) = \frac{2\sqrt{x}}{x+1} - \frac{x}{\sqrt{2+x}} + \frac{\sqrt{x^2+1}}{2\sqrt{9-x^2}}$

(2) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-4x+4}}{\sqrt{x^2+7-4}}$

(3) في إحدى مباريات كرة القدم، تواجد أحد اللاعبين منفردًا وجهاً لوجه مع حارس مرمى الفريق المنافس فقرر رفع الكرة فوق الحارس أملاً ألا تغلو مرمى الفريق المنافس، وكان هذا اللاعب على بعد 16 m من خط المرمى، بينما الحارس يقف على بعد 7 m من اللاعب. يتمذج مسار الكرة المنطلقة من الأرض عبر تسديدة اللاعب على شكل قطع مكافئ معادلته، $y = a(x-10)^2 + 3$

(a) أوجد قيمة a معترضاً نقطة انطلاق تسديدة اللاعب هي نقطة الأصل.

(b) علماً أن الحارس عند استخدام يديه يصل إلى ارتفاع 2.53 m وأن ارتفاع المرمى هو 2.44 m فهل ستخطئ الكرة الحارس؟ وهل سيسجل اللاعب هدفاً؟

(4) في إحدى دورات كرة المضرب، تواجد أحد اللاعبين على بعد 3 m من الشبكة، فقرر اللاعب الثاني المتواجد على الخط الخلفي من الملعب رفع الكرة فوق منافسه على أن تأتي الكرة داخل ملعب منافسه. علماً أن طول ملعب كرة المضرب 23.8 m متوسط الشبكة التي تقسم الملعب إلى قسمين متساويين.

(a) إذا اعتبرنا أن مسار الكرة من مضرب اللاعب على ارتفاع 1 m على شكل قطع مكافئ معادلته، $y = -0.08(x-9)^2 + k$ فما قيمة k ؟

(b) ما الارتفاع الأقصى للكرة عن أرض الملعب؟

(c) هل ستخطئ الكرة اللاعب المنافس إذا كان أقصى ارتفاع يمكن الوصول إليه باستخدام مضربه هو 3.3 m؟

(d) هل ستسقط الكرة داخل ملعب اللاعب المنافس؟ إذا كانت إجابتك نعم، أوجد بعدها عن خط الملعب.

(a) ارسم بيانياً منحنى الدالة، $y = x^2 - 4x$

(b) أوجد معكوس الدالة، ثم ارسمه على المستوى الإحداثي نفسه.

في التمرين (6-10)، حلّ كلٍّ من المعادلات التالية:

(6) $(x-3)(x+2) > (x-3)(2x-1)$

(7) $4x^2 - 9 \leq (3-2x)(x+1)$

(8) $x^2(x-3) > 0$

(9) $(x-6)^2(x-5) > 0$

(10) $\frac{3x-1}{(2x-7)^2} \geq 0$

36

(22) أوجد مجموعة حل كل متباينة مما يلي:

(a) $x^2 - 8x + 15 \leq 0$

(b) $-x^2 + 7x - 120 < 0$

(c) $\frac{3x-4}{x-2} \geq -1$ ($x \neq 2$)

(23) (a) ارسم منحنى الدالة، $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ ، والخط المستقيم $y = -8$ على شبكة إحداثيات واحدة.

(b) ادرس بيانياً، $f(x) > -8$ ، $f(x) < -8$ ، $f(x) = -8$

(c) تحقّق حسابياً من النتائج التي حصلت عليها في الفقرة (b).

(11) أكمل الجدولين التاليين. اكتب في الصف الأخير من كل منهما الفرق بين قيم y المتتالية.

جدول (2)

x	5	4	3	2	1	0
$y = 2x^2$	50	32	18	8	2	0
الفرق				6	2	

جدول (1)

x	5	4	3	2	1	0
$y = 2x$	10	8	6	4	2	0
الفرق				2	2	

(b) أي من الدالتين دالة تربيعية؟

(c) أي نمط تراه في الصف الأخير من الجدول (1)؟ ومن الجدول (2)؟

(d) كوّن جدولاً لكلٍّ من الدالتين، $y = -x^2 + 4$ ، $y = -x + 4$ ، مستخدماً قيم x نفسها في الفقرة (a). هل ترى الأنماط نفسها كما في الفقرة (c)؟

(e) كيف تساعدك قيم y لمجموعة البيانات في توقع ما إذا كانت الدالة الخطية أو الدالة التربيعية هي النموذج الأفضل؟

(12) بيّن الجدول التالي العلاقة بين عمق المياه في المحيط y بالأمتار وسرعة التسونامي x (متر في الثانية / m/s).

x	52	58	61	65	71	76	82	98
y	270.40	336.40	372.10	422.50	504.10	577.60	672.40	960.40

استخدم البيانات المدونة في الجدول لإيجاد معادلة تربيعية تمثل العلاقة بين x ، y ثم تحقّق.

(استخدام الآلة الحاسبة)

37

35