

الوحدة الأولى: التقدير واختبارات الفروض

Estimation and Hypotheses Testing

قُسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

١-١: التقدير

(١-١-١) التقدير بنقطة.

(١-١-ب) التقدير بفترة الثقة.

أولاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 معلوم.

ثانياً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم، $n < 30$.

ثالثاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم، $n \geq 30$.

٢-١: اختبارات الفروض الإحصائية

(١-٢-١) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ معلوم.

(١-٢-ب) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ غير معلوم، $n < 30$.

(١-٢-ج) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ غير معلوم، $n \geq 30$.

مشروع الوحدة: ما هي أفضل طريقة لإيجاد وظيفة؟

- 1 مقدمة المشروع: بعد التخرج يواجه الحاصلون على الإجازات والشهادات الجامعية تحد جديد هو الانخراط في سوق العمل.
- 2 الهدف: هو البحث عن فرص عمل من خلال القيام بعدة خطوات ومحاولات متنوعة واستخدام العديد من الوسائل.
- 3 اللوازم: حاسوب - شبكة الإنترنت.
- 4 أسئلة حول التطبيق:
 - 1 كيف ستختار عينة عشوائية من الموظفين للاستفسار عن الوسيلة التي استخدموها في إيجاد وظيفتهم؟
 - 2 ما الخيارات التي اكتشفتها؟ نظمها في استشارة. (إرشاد):
 - من خلال الأصدقاء والمعارف.
 - من خلال الإعلانات في الصحف والمجلات.
 - من خلال الوكالات المختصة في الربط بين سوق العمل وطالبي الوظائف.
 - من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت.
 - من خلال التقديم مباشرة لطلب وظيفة من الشركة المختصة أو اعتماد وسيلة أخرى (اذكرها...).
 - 3 حدد النسب المتوقعة لكل خيار مما سبق.
 - 4 التقرير: اكتب تقريراً مفصلاً يحدد النسب التي حصلت عليها من خلال العينة العشوائية التي اعتمدها مكوناً جدولاً بالنسب المتوقعة عن كل وسيلة تم استخدامها لإيجاد وظيفة.
- 5 القرار: ضمن تقريرك بعض الاقتراحات والنصائح والاستنتاجات التي نتجت عن تلك الدراسة.

دروس الوحدة

1-1 التقدير	2-1 اختبارات الفروض الإحصائية
(1-1-1) التقدير بنقطة	(2-1-1) σ معلومة
(1-1-1) التقدير بفترة الثقة	(2-1-1) σ غير معلومة، $n < 30$
	(2-1-1) σ غير معلومة، $n \geq 30$

- غالباً ما تكون الأسئلة التي تطرح للاستفادة من شيء ما، أسئلة من نوع التقدير. على سبيل المثال:
- ما هو متوسط توفير الوقود لهذا المحرك؟
- ما هو متوسط تأثير الدواء الجديد على تأخير انتكاسة المريض؟
- ما هو متوسط عمر الجنس البشري العاقل؟
- أما في حالة اختبار الفروض فتكون الأسئلة كما يلي:
- هل متوسط العينة من المجتمع الإحصائي يتفق مع متوسط μ ؟
- هل الدواء الجديد يؤخر الانتكاسة؟

مشروع الوحدة

إن الهدف الأساسي للمتخرجين من المعاهد والجامعات هو إيجاد فرصة عمل وهنا تكمن المشكلة في الوسيلة الأفضل والأصح لإيجاد فرصة العمل.

من هنا يعالج مشروع الوحدة بعض الوسائل المتبعة للدخول في سوق العمل.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

(أ) قد تختلف الإجابات بحسب كل طالب.

(ب) تتنوع الاستثمارات بحسب كل طالب.

(ج) تتنوع الإجابة بحسب كل طالب لأنه ربما قد يجد وسيلة غير تلك المذكورة سابقاً.

التقرير

إعرض تقريرك أمام الصف ليتم مناقشته وذلك من خلال مقارنة الأرقام والنسب المئوية المرتبطة بكل وسيلة، ثم استخدام هذه الأرقام والنسب في عملية البحث عن فرصة عمل ومقارنتها مع الأرقام المشابهة في تقارير زملائك في الصف ليعمل على اعتمادها أو تصحيحها أو حتى رفضها في حال كان هناك فوارق كبيرة في ما بينها.

الوحدة الأولى

أنف إلى معلوماتك

في الوسائل الإعلامية المرئية والمسبوغة والمكتوبة تطالعك نتائج إحصائية تتحدث عن توقعات أحداث معينة تتناول انتخابات نيابية أو رئاسية أو مبيعات أو مباريات... وأكثر ما يستوقفك هو نسبة مئوية معينة مع هامش خطأ محدد والسؤال المهم هو: كيف يتم التقدير وكيف يحسب هامش الخطأ؟ توفر دروس هذه الوحدة فرصة أمام الطلاب للتعرف على التقدير وهامش الخطأ والفروض الإحصائية وكيفية احتسابها.

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- تعلمت مقياس النزعة المركزية: المتوسط الحسابي - الوسيط - النوال.
- تعلمت المجتمع الإحصائي.
- تعلمت العينة واستخداماتها.

ماذا سوف تتعلم؟

- يُعرّف المعلمة والإحصاء.
- إيجاد التقدير بنقطة.
- إيجاد التقدير بفترة ثقة.
- استكشاف الفروض الإحصائية.
- يُعرّف الاختبارات الإحصائية.
- اتخاذ القرار المناسب.

المصطلحات الأساسية

المعلمة - الإحصاء - التقدير - التقدير بنقطة - فترة الثقة - الفروض الإحصائية - المقياس الإحصائي - فرض عدم - فرض البديل - القرار - مستوى المعنوية - درجات الحرية.

سلم التقييم

٤	جدول النسب المئوية صحيح بالكامل - الاقتراحات والاستنتاجات ممتازة ومفيدة - التقرير منظم وواضح ويعكس نتائج بحث مميز.
٣	بعض الأخطاء في الجدول - الاقتراحات والاستنتاجات جيدة ومفيدة - التقرير منظم وواضح ولكن ينقصه الدقة في بعض النقاط.
٢	أخطاء كثيرة في الجدول - الاقتراحات والاستنتاجات مقبولة - التقرير غير منظم وينقصه الوضوح في التفاصيل.
١	معظم عناصر المشروع بحاجة إلى إعادة لأنها ناقصة.

١-١: التقدير

١ الأهداف

- يوجد التقدير بنقطة.
- يوجد التقدير بفترة ثقة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

التقدير - المعلمة - الإحصاء - القيمة الحرجة - التقدير بنقطة - التقدير بفترة ثقة - طرفي فترة الثقة - التوزيع الطبيعي - التوزيع ت - الخطأ بالتقدير بنقطة - الخطأ بالتقدير بفترة - درجات الحرية.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيدي

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) أوجد المتوسط الحسابي للأعداد التالية:

١، ١، ١، ١، ١، ١

١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠

(ب) أوجد الوسيط للأعداد التالية:

١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠

٦، ٦، ٦، ٦، ٦، ٦

(ج) أوجد المنوال للأعداد التالية:

٩، ٨، ١٦، ٧، ٩، ١٠، ٩

٥ التدريس

التعامل مع التقديرات يحتاج إلى الكثير من الدقة والانتباه خاصة عند إجراء الحسابات اللازمة، ومعرفة الفرق بين مستوى الثقة، وفترة الثقة، والقيمة الحرجة.

في المثال (١)

يجب التركيز على أن التقدير بنقطة، ما هو إلا المتوسط الحسابي للأعداد والتي تمثل معدل درجات الحرارة لعينة مكونة من ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة مأخوذة من مجتمع إحصائي. أخبر الطلاب أن هذا المثال يعطي فكرة واضحة عن التقدير بنقطة من خلال إيجاد المتوسط الحسابي لعينة عدد مفرداتها كبير إلى درجة تعطي تقديراً معقولاً لدرجة الحرارة.

التقدير Estimation

دعنا نفكر ونتناقش

متوسط درجات طلاب الصف الثاني عشر في مادة الرياضيات (حيث النهاية العظمى ١٠٠ درجة) في ٥ مدارس بالكويت $\bar{x} = ٨١$

- هل يمكن استخدام هذه العينة لتقدير متوسط الدرجات في كافة مدارس الكويت؟
- ما هي أفضل وسيلة للتقدير لتقريب من الحقيقة؟

سبق لنا في الصف الحادي عشر تعريف المجتمع الإحصائي والعينة العشوائية والأسباب التي تؤدي إلى أخذ العينات لدراسة المجتمع بدلاً من الحصر الشامل، وذلك لتقدير المتوسط الحسابي للمجتمع μ أو الانحراف المعياري له σ .

ويعتبر الوسط الحسابي للمجتمع μ والانحراف المعياري للمجتمع σ من معالم المجتمع، وعادة ما تكون هذه المعالم مجهولة.

ولتقدير هذه المعالم لنلجأ إلى سحب عينة عشوائية منه، ثم نحسب المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} أو الانحراف المعياري s والذي يعتمد على قيم العينة ولا يعتمد على معالم المجتمع.

المعلمة (Parameter):

هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .

الإحصاءة (Statistic Function):

هو اقتران تعين قيمته من العينة كالتوسط الحسابي \bar{x} أو الانحراف المعياري s .

تقدير المعلمة (Parameter Estimate):

هو إحصاءة تعتمد على قيم العينة وتعكس قيمة قريبة لمعلمة المجتمع ككل وتوزيعه.

في هذا الدرس سوف نتعرف طريقتين تساعدان على إيجاد قيم تقديرية لبعض معالم مجتمع معين:

- طريقة أولى: التقدير بنقطة.
- طريقة ثانية: التقدير بفترة ثقة.

١٢

Point Estimate

(١-١) التقدير بنقطة

التقدير بنقطة هي قيمة واحدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.

فمثلاً المتوسط الحسابي للعينة العشوائية \bar{x} يستخدم كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع μ ، وكذلك الانحراف المعياري للعينة s يستخدم كتقدير بنقطة للانحراف المعياري للمجتمع σ .

مثال (١)

تبين البيانات التالية معدل درجة الحرارة عند ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة:

٣٧.٤	٣٦.٩	٣٦.٩	٣٦.٩	٣٧.٢	٣٦.٧	٣٦.٧	٣٧	٣٧	٣٧.١
٣٦.٦	٣٦.٦	٣٧.١	٣٦.٥	٣٦.٤	٣٧.١	٣٦.١	٣٧	٣٧.١	٣٦.٩
٣٦.٣	٣٦.٤	٣٧.٥	٣٧	٣٧.٢	٣٦.٣	٣٧	٣٦.٤	٣٦.٩	٣٦.٨
٣٦.٢	٣٧	٣٦.٧	٣٦.٨	٣٧.٤	٣٧.١	٣٧.٥	٣٦.٨	٣٦.٤	٣٦.٤

استخدم هذه العينة لقيم معدل درجة الحرارة لتوجد أفضل تقدير بنقطة للمتوسط الحسابي μ لمعدل درجة حرارة المجتمع أخذت منه هذه العينة.



الحل:

توجد المتوسط الحسابي \bar{x} لقيم البيانات في العينة التي تمثل

معدل درجة الحرارة عند ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة.

توجد المتوسط الحسابي \bar{x} لقيم البيانات

في العينة التي تمثل معدل درجة الحرارة عند

٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة.

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{١٤٧٢.٨}{٤٠} = ٣٦.٨٢$

∴ القيمة التقديرية للمتوسط الحسابي μ لمعدل درجة حرارة المجتمع الذي أخذت منه هذه

البيانات هي $\mu = ٣٦.٨٢$

حاول أن تحل

١ تبين البيانات التالية درجات ٤٠ طالباً في مادة الرياضيات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة:

١٠، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ١٩، ١٥، ١٥، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ١٢، ١٤، ١٤، ١٦، ١٦، ١٣، ١٦، ١٧، ١٥، ١٤

استخدم هذه العينة لقيم الدرجات لتوجد التقدير بنقطة للمتوسط الحسابي

للمجتمع μ الذي أخذت منه هذه العينة.

١٣

العمل الأساسي في هذا الدرس هو إيجاد فترة الثقة وهي تتضمن قيم تستخدم لتقدير القيمة الصحيحة لمعلم مجتمع إحصائي.

لهذا يجب البدء بفهم مكونات فترة الثقة:

القيمة الحرجة، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، هامش الخطأ والتركيز على إيجادها.

ومن ثم التأكد من فهم الطلاب لمبدأ القيمة الحرجة واستخدام جدول التوزيع الطبيعي لإيجادها.

في المثال (٢)

شرح مفصّل عن كيفية إيجاد القيمة الحرجة المناظرة لمستوى الثقة والخطوات المتبعة لإيجادها.

أعط أمثلة بديلة للطلاب لإيجاد القيمة الحرجة على جدول التوزيع الطبيعي المعياري مستخدماً درجات ثقة متعددة مثل ٨٦٪، ٩٠٪، ٩٢٪...

عند احتساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري،

والقيمة الحرجة، وهامش الخطأ نوجد فترة الثقة التي هي عبارة عن القيمتين $\bar{x} - z_{\alpha/2}$ ، $\bar{x} + z_{\alpha/2}$ ه اللتين تسميان طرفي فترة الثقة.

والتركيز على أنّ استخدام القيمة الحرجة $z_{\alpha/2}$ ، من جدول التوزيع الطبيعي يكون في حالة σ معلومة.

في المثال (٣)

يبين هذا المثال الخطوات المتبعة لاحتساب القيمة الحرجة $z_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة ٩٠٪ وذلك باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري الموجود في نهاية الوحدة.

أرشد الطلاب إلى وجوب العودة إلى هذا الجدول كلما أردنا احتساب القيمة الحرجة.

في المثالين (٤)، (٥)

يبينان بالتفصيل كيف نوجد هامش الخطأ إذا كانت σ معلومة أو غير معلومة. ثم كيف نحسب فترة الثقة ($\bar{x} - z_{\alpha/2}$ ، $\bar{x} + z_{\alpha/2}$) وكيف نفسّر هذه الفترة.

Confidence Interval Estimation (١-١) تقدير فترة الثقة

علماً بما سبق أن لكل مجتمع معالم منها المتوسط الحسابي μ والانحراف المعياري σ ، ودراسة كيفية إيجاد التقدير بنقطة تلك المعالم. وعلماً أن التقدير بنقطة لإحدى معالم المجتمع هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة وبالتالي فإن احتمال الخطأ في التقدير بنقطة يكون كبيراً. ولذلك فإنه من الأفضل إيجاد فترة معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو باحتمال معين. إن مثل هذه الفترة تسمى فترة الثقة.

Confidence Interval فترة الثقة

تعريف: فترة الثقة

هي فترة طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تستخدم لتقدير إحدى معالم المجتمع.

وهذه الفترة تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى مستوى الثقة، فمثلاً إذا كان مستوى الثقة ٩٥٪ فإن نسبة الخطأ في التقدير تكون ٥٪.

يرمز لمستوى الثقة بالرمز $1 - \alpha$ حيث $(\alpha - 1)$ هو معامل مستوى الثقة و α هي نسبة الخطأ في التقدير.

وعلى سبيل المثال:


- إذا كان مستوى الثقة ٩٠٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = ١٠$ ،
- وإذا كان مستوى الثقة ٩٥٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = ٥$ ،
- أيضاً إذا كان مستوى الثقة ٩٩٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = ١$ ،

ومن هذه الخيارات الثلاثة، يعتبر مستوى الثقة ٩٥٪ هو الأكثر انتشاراً لأنه يوازن الأنسب بين الدقة الموضحة من خلال طول فترة الثقة والدقة الموضحة من خلال مستوى الثقة.

Curve of Normal Distribution منحنى التوزيع الطبيعي

تعرفنا فيما سبق على بيان منحنى التوزيع الطبيعي، وعلماً من خواص التوزيع الطبيعي ما يلي:

- المتوسط الحسابي = الوسيط = النوال.
- يكون بيان المنحنى على شكل ناقوس (جرس) متماثل حول محوره (μ).
- يمتد المنحنى من طرفه إلى $-\infty$ وإلى $+\infty$ (لا يقطع المحور الأفقي).
- المساحة تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح (وحدة مساحة).
- المستقيم الرأسي $x = \mu$ يقسم المساحة تحت المنحنى إلى منطقتين متماثلتين مساحة كل منهما تساوي نصف وحدة مساحة كما في الشكل.



منحنى التوزيع الطبيعي المعياري

Curve of Standard Normal Distribution

إذا كان المتوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي $\mu = ٠$ و الانحراف المعياري $\sigma = ١$

يسمى التوزيع الطبيعي بالتوزيع الطبيعي المعياري.

الشكل المرسوم يمثل بيان منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.

المستقيم $x = ٠$ صفر هو محور التماثل للمنحنى.

تأخذ x قيم موجبة وتزداد جهة اليمين بينما

تأخذ x قيمًا سالبة وتقتص جهة اليسار.

Critical Value القيمة الحرجة

الشكل المرسوم يبين منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.

نعلم أن المساحة تحت المنحنى الطبيعي

تساوي الواحد (وحدة المساحة) ولتمثيل

$(\alpha - 1)$ من المساحة الكلية تحت منحنى التوزيع

الطبيعي المعياري نحصر هذه المساحة بين $z_{\alpha/2}$

حدين رأسيين متساويين البعد عن المحور الرأسي

كما هو موضح في الشكل.

نلاحظ أن المحور الرأسي يقسم المساحة $(\alpha - 1)$ إلى نصفين كل منهما يساوي $\frac{\alpha - 1}{2}$.

تكون المساحة المتبقية من المساحة الكلية هي α موزعة على طرفي المنحنى بالتساوي كل منها يساوي $\frac{\alpha}{2}$.

• نعتبر عن الحدين الرأسيين بالرمز $z_{\alpha/2}$ وبالرمز $z_{1-\alpha/2}$ = $-z_{\alpha/2}$ ، حيث $z_{\alpha/2}$ يفصل

مساحة $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيمن ومساحة $\frac{\alpha}{2}$ من المستقيم $x = ٠$ صفر، بينما $-z_{\alpha/2}$ يفصل

مساحة $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيسر ومساحة $\frac{\alpha}{2}$ من المستقيم $x = ٠$ صفر.

• تسمى القيمة الموجبة $z_{\alpha/2}$ بالقيمة الحرجة (Critical Value).

إيجاد القيمة الحرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري:

لإيجاد قيمة $z_{\alpha/2}$ المناظرة للمساحة تحت


المنحنى نحسب المساحة $\frac{\alpha - 1}{2}$ التي تقع على

يسار $z_{\alpha/2}$ وبين الصفر أي في الفترة $[0, z_{\alpha/2}]$

ثم نكشف عنها في الجدول المرفق في نهاية

الوحدة حيث العمود الأول قيم $z_{\alpha/2}$ ابتداءً من

٠،٠ وحتى ٣،١٠ وأكثر. والصف الأول يمثل الأجزاء من المئة لقيم $z_{\alpha/2}$ ، ومنه يمكن تحديد قيمة $z_{\alpha/2}$.



في المثال (٦)

يوضح هذا المثال كيفية إيجاد فترة الثقة إذا كان التباين σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n < 30$ فنستخدم الجدول التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري للعينة مع فنوجد قيمة هامش الخطأ.

في المثال (٧)

يجب تركيز انتباه الطلاب إلى أن حجم العينة $n = 23 > 30$ ، وأن التباين σ^2 للمجتمع الإحصائي غير معلوم لذا يجب إيجاد درجات الحرية أولاً واستخدام جدول التوزيع معرف القيمة الحرجة t_{α} . ساعد الطلاب في التعامل مع جدول التوزيع وكيفية إيجاد القيمة الحرجة.

في المثالين (٨)، (٩)

يبين هذان المثالان كيف نحسب هامش الخطأ وكيف نوجد فترة الثقة لمجتمع إحصائي إذا كان حجم العينة $n \geq 30$ (مثال ٨) أو $n < 30$ (مثال ٩) مستخدمين مستوى ثقة ٩٥٪. ألقت انتباه الطلاب إلى استخدام جدول التوزيع في حالة $n \geq 30$ وفي كل مرة إيجاد درجة الحرية $(n - 1)$ والقيمة الحرجة t_{α} .

Margin of Error

هامش الخطأ

Point Estimation Error

أولاً: الخطأ بالتقدير بنقطة

علمنا فيما سبق أنه يمكن استخدام المتوسط الحسابي للعينة من تقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع. ومن المتوقع أن تكون قيمة المتوسط الحسابي للعينة من غير مساوية لقيمة المتوسط الحسابي للمجتمع. تسمى القيمة المطلقة للفرق بين القيمتين السابقتين بالخطأ المعياري وتساوي $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ حيث σ الانحراف المعياري للمجتمع، n عدد قيم العينة (أو حجم العينة).

Interval Estimation Error

ثانياً: الخطأ بالتقدير بفترة

والآن نتعرض للخطأ بالتقدير بفترة فعندما نستخدم عينة لتقدير المتوسط الحسابي للمجتمع، يكون الخطأ في التقدير هو القيمة المطلقة للفرق بين المتوسط الحسابي للعينة من، والمتوسط الحسابي للمجتمع μ ويعرف هامش الخطأ h :

$$h = t_{\alpha} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ باحتمال } (\alpha - 1), \text{ حيث } \alpha \text{ تعبر عن نسبة الخطأ في التقدير.}$$

وحتى يكون هامش الخطأ أقل ما يمكن يجب أن نتحقق المتباينة:


$$| \bar{x} - \mu | > h$$

$$\text{أي أن: } | \bar{x} - \mu | > h$$

$$-h > \bar{x} - \mu > h$$

$$\bar{x} - h > \mu > \bar{x} + h$$

وعليه تكون فترة الثقة هي $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$.



١٧

Confidence Interval Estimation for the Mean Value μ of Statistical Population

أولاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 معلوم

إذا أخذنا عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي ط (μ, σ^2) وتباينه σ^2 معلوم فإن تقدير فترة الثقة $100(1 - \alpha)\%$ للمتوسط الحسابي μ هي: $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$ حيث \bar{x} المتوسط الحسابي للعينة، h هامش الخطأ. وتسمى القيمتان $\bar{x} - h$ ، $\bar{x} + h$ طرفي فترة الثقة.

ملاحظة: عند إيجاد فترة الثقة $100(1 - \alpha)\%$ سنكتفي بمستوى الثقة ٩٥٪ والتي تناظرها القيمة الحرجة $t_{\alpha} = 1,96$ (من جدول التوزيع الطبيعي المعياري).

تفسير فترة الثقة

عند اختيار عينات عشوائية مختلفة متساوية في الحجم (n) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥٪ من فترات الثقة هذه تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ) . فمثلاً عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n) وفي كل مرة نحسب \bar{x} وفترة الثقة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي μ الحقيقية و ٥ فترات لا تحويها.

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

إذا كانت σ^2 معلومة حيث $n < 30$ أو $n \geq 30$

١ نوجد القيمة الحرجة t_{α} من المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ وهي ١,٩٦.


٢ نوجد هامش الخطأ $h = t_{\alpha} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

٣ نوجد فترة الثقة $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$.

١٨

مثال (٢)

أوجد القيمة الحرجة t_{α} من المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.




حاول أن تحل

١ أوجد القيمة الحرجة t_{α} من المناظرة لمستوى ثقة ٩٧٪ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

مثال (٣)

أوجد القيمة الحرجة t_{α} من المناظرة لمستوى ثقة ٩٠٪ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.



حاول أن تحل

٢ أوجد القيمة الحرجة t_{α} من المناظرة لمستوى ثقة ٩٩٪، باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

١٩

٦ الربط

توفر الأمثلة (١)، (٤)، (٥)، فرصة للطلاب للتعرف على كيفية استخدام التقدير في مواقف حياتية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في استخدام جدول التوزيع الطبيعي، و جدول التوزيع ت لإيجاد القيم الحرجة، لهذا أعطهم أمثلة أخرى لتخطي هذه المشكلة.

٨ التقييم

من المهم جدًا متابعة عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لمعرفة مدى قدرتهم على فهم واستيعاب المطلوب منهم وحلّه.

اختبار سريع

١ أقيمت دراسة على ١٠٠ شخص فتيين أن معدّل استهلاك العصير هو ٦ لترات في الشهر الواحد. أوجد التقدير بنقطة لمعدل استهلاك العصير للمجتمع.

$$\mu = \bar{x} = 6 \text{ لترات}$$

٢ أوجد فترة ثقة بدرجة ثقة ٩٥٪ للمعلمة المجهولة μ إذا كان لدينا: $n = 40$ ، أخذت من مجتمع حيث المتوسط الحسابي μ ، والتباين $\sigma^2 = 20$ ، وعلم أن $\bar{x} = 15$.

$$\text{فترة الثقة: } (16, 386, 13, 614)$$

مثال (٤)



أجريت دراسة لعينة من الإناث حول معدل النبض لديهن فإذا كان حجم عينة الإناث $n = 40$ والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = 12,5$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 76,3$. باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪:

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

الحل:

١: مستوى الثقة ٩٥٪ ∴ القيمة الحرجة $z_{\alpha/2} = 1,96$
 بما أن σ معلومة ∴ هامش الخطأ $h = z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 ∴ $n = 40$ ، $\sigma = 12,5$ ، $\bar{x} = 76,3$ ∴
 $h = 1,96 \times \frac{12,5}{\sqrt{40}}$
 $h = 3,8738$

- فترة الثقة هي $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$

$$(76,3 - 3,8738, 76,3 + 3,8738) = (72,4262, 80,1738)$$

- عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = 40$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

حاول أن تحل

١ من المثال (٤)، إذا أجريت الدراسة على عينة أخرى من الإناث حجمها ١٠٠ والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = 3,6$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 18,4$ باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪:

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

١٩

مثال (٥)

أجريت دراسة لعينة من ١٨ طالبًا حول متوسط عدد ساعات استخدام الأقراص الذكية (TABLETS) أسبوعيًا. فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 1,8$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 15$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪:

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

الحل:

١: مستوى الثقة ٩٥٪ ∴ القيمة الحرجة $z_{\alpha/2} = 1,96$
 ∴ σ معلومة ∴ هامش الخطأ $h = z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 ∴ $n = 18$ ، $\sigma = 1,8$ ، $\bar{x} = 15$ ∴
 $h = 1,96 \times \frac{1,8}{\sqrt{18}}$
 $h = 0,8316$

- فترة الثقة هي $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$

$$(15 - 0,8316, 15 + 0,8316) = (14,1684, 15,8316)$$

- عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = 18$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

حاول أن تحل

١ أجريت دراسة لعينة من ٢٤ طالبًا حول متوسط عدد ساعات مشاهدة التلفزيون أسبوعيًا. فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 2,5$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 21$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪:

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

٢٠

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكر ونتناقش»

- كلا، لا يمكن استخدام هذه العينة لأن نسبة الخطأ كبيرة ولأن العينة صغيرة بالنسبة إلى مجموع مدارس الكويت.
- أفضل وسيلة هي تكبير العينة أو اختيار أكثر من عينة لها نفس الحجم.

«حاول أن تحل»

١ $\bar{s} = 9, 13$ هو تقدير بنقطة للمتوسط الحسابي μ .

٢ $u = \frac{\alpha}{2}, 17$

٣ $u = \frac{\alpha}{2} = \frac{2, 08 + 2, 07}{2} = 2, 075$

٤ (١) $h = 0, 7056$

(٢) فترة الثقة: (١٩, ١٠٥٦, ١٧, ٦٩٤٤)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

($n = 100$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي

حاول أن تحل

- أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها $n = 81$ ومتوسطها الحسابي $\bar{s} = 50, 0$ وانحرافها المعياري $\sigma = 9$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪
١ أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.


نائباً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n \geq 30$.

إذا أخذت عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي تباينه σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n \geq 30$ فإن توزيع العينة لا يؤول إلى التوزيع الطبيعي وفي هذه الحالة يلزمنا استخدام توزيع آخر هو توزيع ت للعينات الصغيرة التي حجمها $n \geq 30$ ويكون تقدير فترة الثقة $(\alpha - 1) / 100$ للمتوسط الحسابي μ هي ($s - h, s + h$) حيث s المتوسط الحسابي للعينة، h هامش الخطأ.

Properties of t Distribution

خواص التوزيع ت

- ١ توزيع شمائل حول متوسطه الحسابي والذي يساوي صفراً، ويمتد إلى $+\infty$ من جهة اليمين وإلى $-\infty$ من جهة اليسار ويزداد قرباً من الصفر في الجهتين.
- ٢ انحرافه المعياري أكبر من الواحد.
- ٣ يعتمد هذا التوزيع على درجات الحرية والتي تساوي ($n - 1$).
- ٤ التوزيع ت يشبه التوزيع الطبيعي إلا أن قمته أكثر انخفاضاً من التوزيع الطبيعي.
- ٥ كلما زادت درجات الحرية اقترب هذا التوزيع من التوزيع الطبيعي ويقرب انحرافه المعياري إلى الواحد الصحيح.



نائباً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n < 30$

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

- ١ إذا كانت σ^2 غير معلومة حيث $n < 30$
- ٢ توجد القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ وهي ١, ٩٦
- ٣ توجد هامش الخطأ $h = t_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$
- ٤ توجد فترة الثقة ($s - h, s + h$).

مثال (٦)


عينة عشوائية حجمها ٣٦، فإذا كان المتوسط الحسابي للعينة ٦٠ وتباينها ١٦، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪
١ أوجد هامش الخطأ.
٢ أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

- الحل:
- ١ مستوى الثقة ٩٥٪
∴ غير معلوم، $n < 30$
∴ التباين $\sigma^2 = 16$
∴ الانحراف المعياري $\sigma = 4$
∴ $s = 60, n = 36$
∴ $h = 1, 96 \times \frac{4}{\sqrt{36}} = 1, 3066$
∴ فترة الثقة هي ($s - h, s + h$)

$$(1, 3066 + 60, 1, 3066 - 60) = (61, 3066, 58, 6934)$$

٢ عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = 36$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

إيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع ت.



- لإيجاد القيمة الحرجة من جدول توزيع ت حيث يبين العمود الأول قيم درجات الحرية ($n - 1$) وتبدأ من ١ إلى ٣٠ وأكثر والصف الأول يمثل قيم $\frac{\alpha}{2}$ ومنه يمكن تحديد $t_{\alpha/2} = t$.

مثال (٧)

أخذت عينة عشوائية بسيطة حجمها $n = 23$ من مجتمع طبيعي.
أوجد القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى الثقة ٩٥٪ باستخدام جدول التوزيع ت.

الحل:

$$n = 23$$

$$\therefore \text{درجات الحرية } (n - 1) = 23 - 1 = 22$$

$$\therefore \text{مستوى الثقة هو } 95\%$$

$$\therefore 1 - \alpha = 95\%$$

$$\therefore \alpha = 5\%$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = 2, 5\%$$

ومن جدول التوزيع ت
تكون قيمة $t_{\alpha/2} = 2, 074$.

حاول أن تحل

- أخذت عينة عشوائية بسيطة حجمها $n = 20$ من مجتمع طبيعي.
أوجد القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى الثقة ٩٥٪ باستخدام جدول التوزيع ت.

٥ (١) هـ $\approx 1,0002$

(٢) فترة الثقة: (٢٢, ٠٠٠٢ ، ١٩, ٩٩٩٨)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

(ن = ٢٤) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

٦ (١) هـ = ١,٩٦

(٢) فترة الثقة: (٥١, ٩٦ ، ٤٨, ٠٤)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

(ن = ٨١) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

٧ ت $\frac{\alpha}{2} = 2,093$

٨ (١) هـ $\approx 1,39$

(٢) فترة الثقة: (٩,٧٩ ، ٧,٠١)

٩ (١) هـ $\approx 2,1528$

(٢) فترة الثقة: (٣٨, ١٥٢٨ ، ٣٣, ٨٤٧٢)

مثال (٨)

أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها ن = ٢٥، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (ع) يساوي ١٠ ومتوسطها الحسابي (س) يساوي ١٥، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:

١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

الحل:

١ $\because \sigma$ غير معلوم، ن ≥ 30

\therefore نستخدم توزيع ت.

$n = 25$

\therefore درجات الحرية (ن - ١) = ٢٤ = ١ - ٢٥

\therefore مستوى الثقة = ١ - ٩٥٪ = ٥٪

$\therefore \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$

$\therefore \frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$

من جدول توزيع ت تكون قيمة ت $t_{\alpha/2, n-1} = 2,064$

هامش الخطأ هـ = ت $\times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$\frac{1}{\sqrt{25}} \times 2,064 = هـ$

$٤,١٢٨ = هـ$

٢ فترة الثقة = (س - هـ، س + هـ)

$(٤,١٢٨ - ١٥,٤, ٤,١٢٨ + ١٥,٤) =$

$(١٩,٢٧٢, ١٠,٨٧٢) =$

حاول أن تحل

٨ أوجد فترة ثقة ٩٥٪ للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ علماً أن العينة أخذت من مجتمع طبيعي.

إذا كان لدينا س = ٤، ع = ٨، ن = ٣، ٢ = ١٣

ويمكن تلخيص الحالات الثلاث السابقة كما في الجدول التالي:

الانحراف المعياري (σ)	حجم العينة (ن)	هامش الخطأ (هـ)	فترة الثقة (س - هـ، س + هـ)
معلوم	٣٠ < ن أو ن ≥ ٣٠	$هـ = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1}$	$(س - هـ، س + هـ) = (س - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1}, س + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1})$
غير معلوم (تستبدل ع)	٣٠ < ن	$هـ = \frac{ع}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1}$	$(س - هـ، س + هـ) = (س - \frac{ع}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1}, س + \frac{ع}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2, n-1})$
	٣٠ ≥ ن	$هـ = \frac{ع}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2}$	$(س - هـ، س + هـ) = (س - \frac{ع}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2}, س + \frac{ع}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2})$

مثال (٩)

أخذت عينة عشوائية حجمها ن = ٦٠، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (ع) يساوي ١٨ ومتوسطها الحسابي (س) يساوي ٣٦، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:

١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

الحل:

١ $\because \sigma$ غير معلوم، ن ≥ 30

\therefore القيمة الحرجة ت $t_{\alpha/2, n-1}$ المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ = ١,٩٦.

$\therefore ع = ١٨، ن = ٦٠$

$\therefore هـ = ت \times \frac{ع}{\sqrt{n}}$

$\frac{18}{\sqrt{60}} \times 1,96 = هـ$

$٤,٥٥٤٦ = هـ$

٢ فترة الثقة = (س - هـ، س + هـ)

$(٤,٥٥٤٦ - ٣٦، ٤,٥٥٤٦ + ٣٦) =$

$(٤٠,٥٥٤٦، ٣١,٤٤٥٤) =$

حاول أن تحل

٩ أخذت عينة عشوائية من ٢٠ بنة لدراسة نموها. فإذا كان متوسط النمو = ٣٦ سم خلال عام والانحراف المعياري للعينة ٤,٦ سم، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:

١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

والآن، بعد أن علمنا كيف نوجد القيم الحرجة ت، يمكننا أن نوجد هامش الخطأ هـ وفترة الثقة.

هامش الخطأ للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ (في حالة σ^2 غير معلوم، ن ≥ 30)

Margin of Error for Mean Value of Statistical Population
Where σ^2 is not known and $n \geq 30$

$هـ = ت \times \frac{ع}{\sqrt{n}}$ حيث ع الانحراف المعياري للعينة

فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ (في حالة σ^2 غير معلوم، ن ≥ 30)

Confidence Interval for Mean Value of Statistical
Population where σ^2 is not known and $n \geq 30$

$(س - هـ، س + هـ)$

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

إذا كانت σ^2 غير معلومة، ن ≥ 30

١ نوجد درجات الحرية (ن - ١).

٢ نوجد القيمة الحرجة ت $t_{\alpha/2, n-1}$ المناظرة لدرجة ثقة ٩٥٪ من جدول توزيع ت.

٣ نوجد هامش الخطأ هـ = ت $\times \frac{ع}{\sqrt{n}}$

٤ نوجد فترة الثقة (س - هـ، س + هـ).

٢-١: اختبارات الفروض الإحصائية

٢-١

اختبارات الفروض الإحصائية Statistical Hypotheses Testing



دعنا نفكر ونتناقش
يتم صنع نوعاً معيناً من المعلبات مسجّل على العلية أن الوزن الصافي ٢٠٠ جرام.
فإذا تم أخذ عينة حجمها ١٠٠ علية وتمّ حساب المتوسط الحسابي لأوزان هذه العينة فوجد أنه ١٩٧,٣ جراماً، فهل يمكن الحكم على هذا المصنع بأنه يقوم ببيعش تجاري؟ ما هي حثيات هذا الحكم؟

نحن نعلم أنه في كثير من الأحيان وفي مواقف معينة نحتاج إلى اتخاذ قرار بناء على معلومات محددة وحيثيات معقولة لها مبررها، لذلك دعت الضرورة إلى دراسة ما يسمى بالفرض الإحصائي واختبارات الفروض الإحصائية.

Statistic Hypothesis

تعريف: الفرض الإحصائي
هو ادعاء معيّن مبني على حيثيات معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .

تعريف: المقياس الإحصائي

هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.

تعريف: اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية)

هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع.

ملاحظة: سنكتفي في هذا الموضوع بدراسة معلمة واحدة من معالم المجتمع وهي المتوسط الحسابي μ .
إليك بعض الأمثلة عن الفروض التي يمكن اختبارها من خلال الطرق التي سنتطرقها في هذا الدرس.
على سبيل المثال:

- في إدارة الأعمال: تدعي إحدى الصحف في مقال لها أنّ معظم الموظفين يجدون عملاً عن طريق وكالات التوظيف.
- في الطب: يدعي باحثون في الطب أنّ متوسط درجة حرارة جسم أي بالغ معافى ليست ٣٧ سيليزية.
- في سلامة الطيران المدني: تدعي إدارة الطيران المدني أنّ متوسط وزن المسافرين (مع حقائب) يتعدى الوزن المسموح منذ عشرين منذ سنه والبالغ ٨٤ كجم.

٢٧

سوف نتعلم

- القيمة الحرجة.
- مستوى المعنوية.
- درجة المعنوية.
- الفروض.
- اختبار الفروض.
- فرض العدم.
- الفرض البديل.

١ الأهداف

- يوجد القيمة الحرجة، مستوى المعنوية، درجة الحرية.
- يضع فرض العدم والفرض البديل.
- يتخذ القرارات المناسبة بالقبول أو الرفض.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

- الفرض - الفرض الإحصائي - المقياس الإحصائي - اختبار الفروض الإحصائية - فرض العدم - الفرض البديل.

٣ الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) ما القيمة الحرجة α لمستويات الثقة: ٩٥٪، ٩٠٪، ٨٠٪؟

(ب) ما الفرق بين مستوى الثقة ومستوى المعنوية؟

(ج) متى يستخدم التوزيع t ومتى يستخدم التوزيع الطبيعي؟

(د) ما هي درجات الحرية؟

Null and Alternative Hypotheses

فرض العدم والفرض البديل

- فرض العدم (ف): يفيد بأن قيمة معلمة المجتمع (مثل المتوسط الحسابي μ) تساوي قيمة مزعومة.
- نختبر فرض العدم مباشرة أي نفترض بأنه صحيح ونوصل إلى خلاصة برفض أو عدم رفض ف.
- الفرض البديل (ف): يفيد بأن للمعلمة قيمة تختلف نوعاً ما عن فرض العدم (ف).
- يضم الشكل الرمزي للفرض البديل أحد هذه الرموز: $>$ أو $<$ أو \neq .

وستقتصر دراستنا على الحالة (ف). فمثلاً: $\mu = ٩٨,٦$ ، $\mu > ٩٨,٦$ ، $\mu < ٩٨,٦$.

الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفروض الإحصائية:

- 1 صياغة الفروض الإحصائية (فرض العدم ف، والفرض البديل ف).
- 2 التحقق من الانحراف المعياري للمجتمع σ (معلوم أم غير معلوم) وتحديد حجم العينة (ن) ومن ثم إيجاد المقياس الإحصائي للاختبار (ت أو ت)، (مسترشداً بالجدول التالي):


حجم العينة (ن)	المقياس الإحصائي (ت أو ت)	الانحراف المعياري (σ)
لا يشترط حجم معين للعينة	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	معلوم
$30 < n$	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	غير معلوم (تستبدل σ بـ s)
$30 \geq n$	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	

1 تحديد مستوى المعنوية α وحساب القيمة الجدولية t_{α} من جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو القيمة الجدولية t_{α} من جدول t ذي درجات حرية.

2 تحديد منطقة القبول: (t_{α} ، t_{α}) أو ($-t_{\alpha}$ ، t_{α}) كما هو موضح بالشكل.

3 اتخاذ القرار الإحصائي (قبول فرض العدم) أو (رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل).

ملاحظة: ستقتصر دراستنا على مستوى ثقة ٩٥٪.



٢٨

٥ التدریس

في هذا الدرس يتعلم الطالب كيفية وضع فروض واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج الحسابات التي سيقوم بها. ابدأ بتفسير أن في الإحصاء، الفرض هو ادعاء أو تصريح حول خاصية ما للمجتمع. لا اختبار صوابية هذا الادعاء علينا القيام بعدة خطوات متسلسلة:

- وضع الفروض H_0 ، H_1 المناسبة.
- احتساب القيمة t أو z (الاختبار الإحصائي).
- إيجاد الفترة المناسبة.

- اتخاذ قرار:
 - رفض فرض العدم
 - قبول فرض العدم

في المثال (١)

في هذا المثال يدرك الطالب متى عليه استخدام المقياس t أو المقياس z (عند معرفة الانحراف المعياري σ نستخدم z)، وأن القيمة الجدولية t_{α} تستخرج من الجدول للتوزيع الطبيعي المعياري كما في الدرس السابق. شدّد للطلاب على ضرورة الانتباه ما إذا كانت القيمة المعطاة هي تباين أو انحراف معياري. ذكّرهم بأن الانحراف المعياري \sqrt{v} التباين.

في الأمثلة (٢)، (٣)، (٤)

ترتكز هذه الأمثلة على قبول فرض العدم أو الفرض البديل. يطبّق الطلاب فيها الخطوات اللازمة بالتسلسل. شدّد لهم على ضرورة الانتباه إلى الفرق بين مستوى المعنوية ومستوى الثقة، وأن حدّي الفترة ما هما إلا القيمة الجدولية (القيمة الحرجة) ومعكوسها الجمعي، وأن القيمة t أو z يمكن أن تكون سالبة، عندما يكون المتوسط الحسابي للعينة أصغر من قيمة الفرض.

شدّد على أن صياغة الإجابة النهائية يمكن أن تتم بعدة طرق، مع ضرورة ذكر: رفض فرض العدم أو عدم رفض فرض العدم.

نبّه الطلاب إلى ضرورة استخدام المقياس الإحصائي t في المثال (٤) لأن حجم العينة $n = 10 > 30$ والانحراف المعياري σ للمجتمع الإحصائي غير معلوم.

(١-٢) إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع σ معلوم

مثال (١)

تزعم شركة أن متوسط رواتب موظفيها يساوي ٤٠٠٠ دينار كويتي. إذا أخذت عينة من ٢٥ موظفًا، ووجد أن متوسط رواتب العينة هو ٣٩٥٠ دينارًا كويتيًا فإذا علمت أن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = ١٢٥$ دينارًا، وضح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي بمستوى ثقة ٩٥٪. الحل:

- صياغة الفروض
- ف: $\mu = 4000$ مقابل $H_1: \mu \neq 4000$
- $\sigma = 125$ (معلومة)
- نستخدم المقياس الإحصائي z : $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
- $z = \frac{3950 - 4000}{\frac{125}{\sqrt{25}}} = -4$
- مستوى الثقة ٩٥٪
- $\alpha = 0.05$ ، $\frac{\alpha}{2} = 0.025$
- منطقة القبول هي $(-1.96, 1.96)$
- $-4 < -1.96$
- القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 4000$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 4000$

حاول أن تحل

- يزعم صانع إطارات أن متوسط عمر الإطارات التي يصنعها $\mu = 25000$ كم. إذا أخذت عينة عشوائية من ١٥ إطارًا وأظهرت أن متوسطها الحسابي $\bar{x} = 27000$ كم. إذا علمت أن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 5000$ كم فوضح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي لمستوى ثقة ٩٥٪.

٢٩

مثال (٢)

بيّنت الدراسة أن قوة تحمل أسلاك معدنية لها متوسط حسابي $\mu = 1800$ كجم مع انحراف معياري $\sigma = 150$ كجم. ويؤكد الأخصائيون في المصنع المنتج لهذه الأسلاك أن بإمكانهم زيادة قوة تحمل هذه الأسلاك، وتأكيدًا على ذلك تمّ اختبار عينة من ٤٠ سلكًا فيجاءت أن متوسط تحمل هذه الأسلاك يساوي ١٨٤٠ كجم.

هل يمكن قبول مثل هذا الفرض بمستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ؟ الحل:

- صياغة الفروض
- ف: $\mu = 1800$ مقابل $H_1: \mu \neq 1800$
- $\sigma = 150$ (معلومة)
- نستخدم المقياس الإحصائي z : $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
- $z = \frac{1840 - 1800}{\frac{150}{\sqrt{40}}} = 1.6865$
- $\alpha = 0.05$ ، $\frac{\alpha}{2} = 0.025$
- منطقة القبول هي $(-1.96, 1.96)$
- $1.6865 < 1.96$
- القرار: يقبل فرض العدم $\mu = 1800$

حاول أن تحل

- متوسط العمر لعينة من ١٥٠ مصباحًا كهربائيًا مصنعة في أحد المصانع هو $\bar{x} = 1580$ ساعة بالانحراف المعياري $\sigma = 125$ ساعة. يقول صاحب المصنع أن متوسط العمر $\mu = 1620$ ساعة. اختبر الفرض $H_0: \mu = 1620$ ساعة مقابل الفرض $H_1: \mu \neq 1620$ ساعة باختبار مستوى معنوية $\alpha = 0.05$.

٣٠

٦ الربط

الأمثلة (١-٤)، تسمح للطلاب التعرف على مجالات استخدام اختبارات الفروض الإحصائية في المواقف الحياتية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

من الأخطاء الشائعة جداً التي يقع فيها الطلاب في اتخاذ القرار إن كان من جهة رفض أو عدم رفض فرض العدم. شدد للطلاب على ضرورة الانتباه دائماً إلى هذه الفروض والعودة إلى فقرة «معيار القرار» وفقرة «ملخص الخطوات» في كتاب الطالب لتجنب الوقوع بها وارتكابها.

٨ التقييم

تابع عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل»، للتأكد من أنهم يتبعون الخطوات جميعها وبالتسلسل الصحيح للوصول إلى النتيجة النهائية.

(١-٢-ب) إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع غير معلوم، $n < 30$

مثال (٣)

إذا كانت $n = 80$ ، $\bar{x} = 37$ ، $s = 1.79$ ،
اختبر الفرض بأن $\mu = 37$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$.

الحل:

١ صياغة الفروض

ف: $\mu = 37$ مقابل ف: $\mu \neq 37$

٢ σ غير معلومة، $n < 30$

∴ نستخدم المقياس الإحصائي t : $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

∴ $n = 80$ ، $\bar{x} = 37$ ، $s = 1.79$

∴ $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

$$t = \frac{37 - 37}{\frac{1.79}{\sqrt{80}}} = 0$$

٣ $\alpha = 0.05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

∴ $t_{\alpha/2} = 1.96$

٤ منطقة القبول هي $(-1.96, 1.96)$

٥ $0 > 1.96$ ، $0 < -1.96$

∴ القرار بقبول فرض العدم $\mu = 37$

حاول أن تحل

٢ متوسط العمر لعينة من 100 مصباح كهربائي مصنعة في أحد المصانع $\bar{x} = 1570$ ساعة بانحراف معياري $s = 120$ ساعة. يقول صاحب المصنع إن متوسط العمر $\mu = 1600$ ساعة للمصباح المصنعة في المصنع.
اختبر صحة الفرض $\mu = 1600$ ساعة مقابل الفرض $\mu \neq 1600$ ساعة وباختيار مستوى معنوية $\alpha = 0.05$.
(إرشاد: ف: $\mu = 1600$ ، ف: $\mu \neq 1600$).

٣١

(١-٢-ج) إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع غير معلوم، $n \geq 30$

مثال (٤)



يمتد مدير شركة دراسات إحصائية أن متوسط الإنفاق الشهري على الطعام في منازل مدينة معينة يساوي 290 ديناراً كويتيًّا. فإذا أخذت عينة عشوائية من 10 منازل تبين أن متوسطها الحسابي $\bar{x} = 283$ ديناراً وانحرافها المعياري $s = 32$ ديناراً.

فهل يمكن الاعتماد على هذه العينة لتأكيد ما افترضه؟

استخدم مستوى ثقة 95% (علماً بأن المجتمع يتبع توزيعاً طبيعيًّا).

الحل:

١ صياغة الفروض: ف: $\mu = 290$

مقابل ف: $\mu \neq 290$

٢ σ غير معلومة، $n \geq 30$

∴ نستخدم المقياس الإحصائي t : $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

∴ $n = 10$ ، $\bar{x} = 283$ ، $s = 32$

∴ $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

∴ $t = \frac{283 - 290}{\frac{32}{\sqrt{10}}} = -0.6917$

٣ مستوى الثقة 95%، درجات الحرية $(n-1) = 10-1 = 9$

∴ $\alpha = 0.05 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$

∴ $t_{\alpha/2} = 2.262$

٤ منطقة القبول هي $(-2.262, 2.262)$

٥ $-0.6917 > 2.262$ ، $-0.6917 < -2.262$

∴ القرار بقبول فرض العدم $\mu = 290$

حاول أن تحل

٤ في المثال (٤)، إذا أجريت دراسة إحصائية أخرى على المدينة ذاتها وتبين من خلالها أن $\bar{x} = 296$ ، $s = 5$ لعينة من 10 منازل مع استخدام درجة الثقة نفسها. فهل يبقى الافتراض المدير عند الشركة صحيحاً أم لا؟ وضح إجابتك.

٣٢

اختبار سريع

لدينا: $n = 400$ ، $\bar{x} = 18$ ، $\sigma = 36$ ، $\mu = 16.6$

١ ما قيمة t ؟

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{16.6 - 18}{\frac{36}{\sqrt{400}}} = -0.6$$

٢ مستوى ثقة 95%، ضع فرض العدم، والفرض

البديل، واتخذ القرار المناسب.

ف: $\mu = 16.6$ مقابل ف: $\mu \neq 16.6$

$\alpha = 0.05$ ، $t_{\alpha/2} = 1.96$ لا تقع على الفترة

$(-1.96, 1.96)$

إذا نرفض فرض العدم، $\mu = 16.6$

ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 16.6$

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكر ونتناقش»

لا يمكن الحكم لعدم كفاية المعطيات.

«حاول أن تحل»

١ ف. $\mu = 25000$

ف. $\mu \neq 25000$

$$u = \frac{25000 - 27000}{15\sqrt{}} \approx 1,0492$$

فترة الثقة هي: $(-1,96, 1,96)$ و $1,0492$ تقع

داخل الفترة، إذاً نقبل فرض العدم

ف. $\mu = 25000$

٢ ف. $\mu = 1620$ مقابل ف. $\mu \neq 1620$

$u = -3,9192$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$

$-3,9192$ لا تقع على الفترة $(-1,96, 1,96)$

إذاً نرفض فرض العدم ف. $\mu = 1620$

٣ ف. $\mu = 1600$

ف. $\mu \neq 1600$

$u = -2,5$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$

$-2,5$ لا تقع على الفترة $(-1,96, 1,96)$

إذاً نرفض فرض العدم ف. $\mu = 1600$

٤ ف. $\mu = 290$ مقابل ف. $\mu \neq 290$

$t = 3,7948$

فترة القبول: $(-2,262, 2,262)$

$3,7948$ فترة القبول

∴ القرار برفض فرض العدم $\mu = 290$

تَمَرُّن
١-١

التقدير

Estimation

المجموعة أ تمارين أساسية

- (١) أوجد القيمة الحرجة t_{α} المناظرة لكل مستويات الثقة التالية، وذلك باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.
- (أ) 297 (ب) 294
- (ج) 298 (د) 292
- (٢) عينة عشوائية حجمها $n = 64$ أخذت من مجتمع إحصائي تباينه $\sigma^2 = 16$ ، فإذا علم أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 13$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.
- (٣) قامت شركة عالمية بدراسة لمعرفة كفاءة أداء سياراتها، فأخذت عينة من 1000 سيارة. استنتجت أن السيارة تبقى في حالة جيدة عند متوسط حسابي $\bar{x} = 5$ سنوات. علمًا بأن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 0,5$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.
- (٤) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 25$ ، ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 8$ ، فإذا علمت أن التباين للمجتمع $\sigma^2 = 1,25$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.
- (٥) في دراسة للمدة الزمنية المطلوبة من طلاب جامعيين لإنهاء دراستهم، اختير عشوائيًا 80 طالبًا، فكان متوسط السنوات لهذه العينة $\bar{x} = 4,8$ سنوات، والانحراف المعياري لهذه العينة $\bar{s} = 2,2$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.

٨

- (٦) عينة عشوائية حجمها $n = 13$ ، ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 30$ ، وانحرافها المعياري $\bar{s} = 3,5$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (١) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 64$ ، فوجد أن متوسط العينة $\bar{x} = 160$ ، والانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 50$ ، باستخدام مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.
- (٢) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 11$ من مجتمع تباينه $\sigma^2 = 44$ ، فوجد أن $\bar{x} = 30,5$ ، عند مستوى ثقة 295 أوجد:
- (أ) هامش الخطأ.
- (ب) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (٣) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 32$ فإذا كان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 14,3$ وانحرافها المعياري $\bar{s} = 0,8$ ، عند مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (ج) فسّر فترة الثقة.
- (٤) يعتبر الخفاش الطنان من أصغر الثدييات في العالم ويبلغ حجمه تقريبًا حجم نحلة طنانة كبيرة. أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 15$ فإذا كان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 1,7$ ، والانحراف المعياري $\bar{s} = 0,4$ ، عند مستوى ثقة 295 أوجد:
- (أ) هامش الخطأ.
- (ب) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M .
- (٥) أثناء التدخين، يتحوّل النيكوتين إلى كوتينين، وهي مادة من السهل قياسها. إذا كان المتوسط الحسابي لعينة من 40 مدخنًا تعطي مستوى كوتينين قدره $\bar{x} = 172,5$ ، فإذا علمت أن $\bar{s} = 119,5$ ، عند مستوى ثقة 295
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي M لمستوى الكوتينين لدى جميع المدخنين.
- (ج) فسّر فترة الثقة.

٩

إجابة «مسألة إضافية»

الفروض: $\mu = 2000$ مقابل $\mu = 2000 \neq$

$$n = \frac{s - \bar{s}}{\frac{e}{\sqrt{n}}} = \frac{2000 - 2100}{\frac{800}{100\sqrt{n}}} = 1,25$$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$


١,٢٥ تقع على الفترة

إذا نقبل فرض العدم

$\mu = 2000$ ف.

إذا كانت حملة هذه المؤسسة ناجحة.

مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



٣٤

المرشد لحل المسائل

نظرًا لأهمية المياه بالنسبة إلى صحة الإنسان وحياته، قررت مؤسسة تعنى بذلك، القيام بحملة تهدف إلى التأكد من أن كل شخص يستهلك متوسط قدره ٢٠٠٠ ملل يوميًا من مياه الشرب. في دراسة سابقة لعينة من ١٠٠ شخص، لاحظت المؤسسة أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $\bar{s} = 1850$ ملل مع انحراف معياري $e = 900$ ملل. وفي دراسة جديدة لعينة من ١٠٠ شخص، وبعد القيام بحملتها، لاحظت أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $\bar{s} = 1900$ ملل مع انحراف معياري $e = 300$ ملل. اعتقدت المؤسسة أن حملتها قد نجحت بما أن المتوسط الحسابي للاستهلاك قد ازداد ٥٠ ملل وقد اقترب كثيرًا من هدفها وهو ٢٠٠٠ ملل يوميًا للشخص الواحد. هل المؤسسة على حق؟ اشرح.

الحل:

وضع يوسف جدولًا ليختبر فرضية الشركة من خلال اختبارات إحصائية مع:

ف: $\mu = 2000$ مقابل ف: $\mu \neq 2000$ ومستوى الثقة ٠,٩٥.

المعايير	الدراسة السابقة	الدراسة الجديدة
القيمة الجدولية	$\bar{s} = 1850, e = 900, n = 100$	$\bar{s} = 1900, e = 300, n = 100$
قيمة الاختبار الإحصائي	$n = \frac{s - \bar{s}}{\frac{e}{\sqrt{n}}} = 1,66$	$n = \frac{s - \bar{s}}{\frac{e}{\sqrt{n}}} = 3,33$
الفترة	$(-1,96, 1,96)$	$(-1,96, 1,96)$
القرار	قبول ف: $\mu = 2000$ ملل يوميًا	رفض ف: والأخذ بـ ف: $\mu \neq 2000$ ملل يوميًا

الاستنتاج:

لم تكن الحملة ضرورية، والحصول على قيمة متوسطة أكبر لا يعني الاقتراب من الهدف المنشود.

مسألة إضافية

قامت مؤسسة أخرى بحملة على عينة من ١٠٠ شخص تهدف إلى التأكد من أن المتوسط الحسابي للاستهلاك كل شخص لمياه الشرب $\mu = 2000$ ملل يوميًا. فأنت النتائج على الشكل التالي:

$\bar{s} = 2100$ ملل، $e = 800$ ملل. براك، هل كانت حملة هذه المؤسسة ناجحة؟

ملخص

- المعلمة هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالمتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .
- الإحصاء هو اقران تميّز قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي \bar{s} أو الانحراف المعياري e .
- التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.
- فترة الثقة هي فترة طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى درجة الثقة (مستوى الثقة).
- α هي درجة الخطأ (نسبة) الخطأ في التقدير.
- مستوى الثقة $1 - \alpha$ ويسمى $(\alpha - 1)$ عاملاً مستوى الثقة.
- n_p هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.
- \bar{s} هو المتوسط الحسابي للعينة.
- e هو الانحراف المعياري للعينة.
- t_p هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع ت.
- هامش الخطأ $h = n_p \cdot \frac{e}{\sqrt{n}}$ في حالة الانحراف المعياري σ معلوم والتوزيع الطبيعي.
- هامش الخطأ $h = t_p \cdot \frac{e}{\sqrt{n}}$ في حالة الانحراف المعياري σ غير معلوم و $n < 30$ والتوزيع الطبيعي.
- هامش الخطأ $h = t_p \cdot \frac{e}{\sqrt{n}}$ إذا كانت σ غير معلوم و $n \geq 30$ والتوزيع طبيعي.
- الفرض الإحصائي: هو ادعاء معين مبني على حثيات معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .
- المقياس الإحصائي هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.
- اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية) هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع.


٣٥

٣٣



جدول التوزيع ت

جدول التوزيع ت						
$\frac{\alpha}{2}$						
درجات الحرية	٠,٠٥	٠,١٠	٠,٢٥	٠,٥٠	١,٠٠	٢,٠٠
١	١,٦٤٥	١,٦٤٥	١,٦٤٥	١,٦٤٥	١,٦٤٥	١,٦٤٥
٢	١,٠٥٤	١,٠٥٤	١,٠٥٤	١,٠٥٤	١,٠٥٤	١,٠٥٤
٣	٠,٩٥٩	٠,٩٥٩	٠,٩٥٩	٠,٩٥٩	٠,٩٥٩	٠,٩٥٩
٤	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩
٥	٠,٧٥٨	٠,٧٥٨	٠,٧٥٨	٠,٧٥٨	٠,٧٥٨	٠,٧٥٨
٦	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٧	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٩	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٠	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١١	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٢	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٣	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٤	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٥	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٦	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٧	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
١٩	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٠	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢١	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٢	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٣	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٤	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٥	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٦	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٧	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٢٩	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨
٣٠ وأكثر	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨	٠,٦٥٨



جدول التوزيع الطبيعي المعياري (ن)

ن	٠,٠٩	٠,٠٨	٠,٠٧	٠,٠٦	٠,٠٥	٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠٢	٠,٠١	٠,٠٠
٠,٠	٠,٠٣٥٩	٠,٠٣١٩	٠,٠٢٧٩	٠,٠٢٣٩	٠,٠١٩٩	٠,٠١٦٠	٠,٠١٢٠	٠,٠٠٨٠	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠٠٠
٠,١	٠,٠٧٥٣	٠,٠٧١٤	٠,٠٦٧٥	٠,٠٦٣٦	٠,٠٥٩٦	٠,٠٥٥٧	٠,٠٥١٧	٠,٠٤٧٨	٠,٠٤٣٨	٠,٠٣٩٨
٠,٢	٠,١١٤١	٠,١١٠٣	٠,١٠٦٤	٠,١٠٢٦	٠,٠٩٨٧	٠,٠٩٤٨	٠,٠٩٠٩	٠,٠٨٧١	٠,٠٨٣٢	٠,٠٧٩٣
٠,٣	٠,١٥١٧	٠,١٤٨٠	٠,١٤٤٣	٠,١٤٠٦	٠,١٣٦٨	٠,١٣٣١	٠,١٢٩٣	٠,١٢٥٥	٠,١٢١٧	٠,١١٧٩
٠,٤	٠,١٨٩٤	٠,١٨٥٤	٠,١٨١٨	٠,١٧٧٢	٠,١٧٣٦	٠,١٧٠٠	٠,١٦٦٤	٠,١٦٢٨	٠,١٥٩٢	٠,١٥٥٤
٠,٥	٠,٢٢٩٢	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠	٠,٢٢٩٠
٠,٦	٠,٢٥٤٤	٠,٢٥١٧	٠,٢٤٨٦	٠,٢٤٥٤	٠,٢٤٢٢	٠,٢٣٨٩	٠,٢٣٥٦	٠,٢٣٢٤	٠,٢٢٩١	٠,٢٢٥٧
٠,٧	٠,٢٨٥٢	٠,٢٨٢٣	٠,٢٧٩٤	٠,٢٧٦٤	٠,٢٧٣٤	٠,٢٧٠٤	٠,٢٦٧٣	٠,٢٦٤٢	٠,٢٦١١	٠,٢٥٨١
٠,٨	٠,٣١٣٣	٠,٣١٠٦	٠,٣٠٧٨	٠,٣٠٥١	٠,٣٠٢٣	٠,٢٩٩٥	٠,٢٩٦٧	٠,٢٩٣٩	٠,٢٩١١	٠,٢٨٨١
٠,٩	٠,٣٣٨٩	٠,٣٣٦٥	٠,٣٣٤٠	٠,٣٣١٥	٠,٣٢٩٠	٠,٣٢٦٤	٠,٣٢٣٨	٠,٣٢١٢	٠,٣١٨٦	٠,٣١٥٩
١,٠	٠,٣٦٢١	٠,٣٥٩٩	٠,٣٥٧٧	٠,٣٥٥٤	٠,٣٥٣١	٠,٣٥٠٨	٠,٣٤٨٥	٠,٣٤٦١	٠,٣٤٣٨	٠,٣٤١٣
١,١	٠,٣٨٣٠	٠,٣٨١٠	٠,٣٧٩٠	٠,٣٧٧٠	٠,٣٧٥٠	٠,٣٧٣٠	٠,٣٧١٠	٠,٣٦٩٠	٠,٣٦٦٥	٠,٣٦٤٣
١,٢	٠,٤٠١٥	٠,٣٩٩٧	٠,٣٩٨٠	٠,٣٩٦٢	٠,٣٩٤٤	٠,٣٩٢٥	٠,٣٩٠٧	٠,٣٨٨٨	٠,٣٨٦٩	٠,٣٨٥١
١,٣	٠,٤١٧٧	٠,٤١٦٢	٠,٤١٤٧	٠,٤١٣١	٠,٤١١٥	٠,٤٠٩٩	٠,٤٠٨٣	٠,٤٠٦٦	٠,٤٠٤٩	٠,٤٠٣٢
١,٤	٠,٤٣١٩	٠,٤٣٠٦	٠,٤٢٩١	٠,٤٢٧٩	٠,٤٢٦٥	٠,٤٢٥١	٠,٤٢٣٦	٠,٤٢٢٢	٠,٤٢٠٧	٠,٤١٩٢
١,٥	٠,٤٤٤١	٠,٤٤٢٩	٠,٤٤١٨	٠,٤٤٠٦	٠,٤٣٩٤	٠,٤٣٨٢	٠,٤٣٧٠	٠,٤٣٥٧	٠,٤٣٤٥	٠,٤٣٣٢
١,٦	٠,٤٥٤٥	٠,٤٥٣٥	٠,٤٥٢٥	٠,٤٥١٥	٠,٤٥٠٥	٠,٤٤٩٥	٠,٤٤٨٥	٠,٤٤٧٥	٠,٤٤٦٣	٠,٤٤٥٢
١,٧	٠,٤٦٣٣	٠,٤٦٢٥	٠,٤٦١٦	٠,٤٦٠٨	٠,٤٦٠٠	٠,٤٥٩١	٠,٤٥٨٢	٠,٤٥٧٣	٠,٤٥٦٤	٠,٤٥٥٥
١,٨	٠,٤٧٠٦	٠,٤٦٩٩	٠,٤٦٩٣	٠,٤٦٨٦	٠,٤٦٧٨	٠,٤٦٧١	٠,٤٦٦٤	٠,٤٦٥٦	٠,٤٦٤٩	٠,٤٦٤١
١,٩	٠,٤٧٧٧	٠,٤٧٦١	٠,٤٧٥٦	٠,٤٧٥٠	٠,٤٧٤٤	٠,٤٧٣٨	٠,٤٧٣٢	٠,٤٧٢٦	٠,٤٧٢٠	٠,٤٧١٣
٢,٠	٠,٤٨١٧	٠,٤٨١٢	٠,٤٨٠٨	٠,٤٨٠٣	٠,٤٧٩٨	٠,٤٧٩٣	٠,٤٧٨٨	٠,٤٧٨٣	٠,٤٧٧٨	٠,٤٧٧٣
٢,١	٠,٤٨٥٥	٠,٤٨٥٤	٠,٤٨٥٠	٠,٤٨٤٦	٠,٤٨٤٢	٠,٤٨٣٨	٠,٤٨٣٤	٠,٤٨٣٠	٠,٤٨٢٦	٠,٤٨٢١
٢,٢	٠,٤٨٩٠	٠,٤٨٨٧	٠,٤٨٨٤	٠,٤٨٨١	٠,٤٨٧٨	٠,٤٨٧٥	٠,٤٨٧١	٠,٤٨٦٨	٠,٤٨٦٤	٠,٤٨٦١
٢,٣	٠,٤٩١٦	٠,٤٩١٣	٠,٤٩١١	٠,٤٩٠٩	٠,٤٩٠٦	٠,٤٩٠٤	٠,٤٩٠١	٠,٤٨٩٨	٠,٤٨٩٦	٠,٤٨٩٣
٢,٤	٠,٤٩٣٧	٠,٤٩٣٤	٠,٤٩٣٢	٠,٤٩٣١	٠,٤٩٢٩	٠,٤٩٢٥	٠,٤٩٢٥	٠,٤٩٢٢	٠,٤٩٢٠	٠,٤٩١٨
٢,٥	٠,٤٩٥٥	٠,٤٩٥١	٠,٤٩٤٩	٠,٤٩٤٨	٠,٤٩٤٦	٠,٤٩٤٥	٠,٤٩٤٣	٠,٤٩٤١	٠,٤٩٤٠	٠,٤٩٣٨
٢,٦	٠,٤٩٦٦	٠,٤٩٦٣	٠,٤٩٦٢	٠,٤٩٦١	٠,٤٩٦٠	٠,٤٩٥٩	٠,٤٩٥٧	٠,٤٩٥٥	٠,٤٩٥٥	٠,٤٩٥٣
٢,٧	٠,٤٩٧٤	٠,٤٩٧٣	٠,٤٩٧٢	٠,٤٩٧١	٠,٤٩٧٠	٠,٤٩٦٩	٠,٤٩٦٨	٠,٤٩٦٦	٠,٤٩٦٦	٠,٤٩٦٥
٢,٨	٠,٤٩٨١	٠,٤٩٨٠	٠,٤٩٧٩	٠,٤٩٧٩	٠,٤٩٧٨	٠,٤٩٧٧	٠,٤٩٧٧	٠,٤٩٧٦	٠,٤٩٧٥	٠,٤٩٧٥
٢,٩	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٨٥	٠,٤٩٨٥	٠,٤٩٨٤	٠,٤٩٨٤	٠,٤٩٨٣	٠,٤٩٨٣	٠,٤٩٨٢	٠,٤٩٨١
٣,٠	٠,٤٩٩٠	٠,٤٩٩٠	٠,٤٩٨٩	٠,٤٩٨٩	٠,٤٩٨٩	٠,٤٩٨٨	٠,٤٩٨٨	٠,٤٩٨٧	٠,٤٩٨٧	٠,٤٩٨٧
٣,١٠ وأكثر	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩	٠,٤٩٩٩

ملاحظة: استخدم ٤٩٩٩,٠ عندما تزيد قيمة ن عن ٣,٠٩

تمرين ٢-١

اختبارات الفروض الإحصائية Hypotheses Testing

المجموعة ١ تمارين أساسية

- أخذت عينة عشوائية من مجتمع قيد الدراسة حجمها $n = ١٥٠$ ، فوجد أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = ٣٠,٣$ ، انحرافها المعياري $\sigma = ٦,٥$.
اختبر الفرض إذا كان المتوسط الحسابي للمجتمع هو $\mu = ٣٠$ ، مقابل الفرض البديل $\mu \neq ٣٠$ عند مستوى ثقة ٩٥%.
- في دراسة لعدد ساعات استخدام الحاسوب، أخذت عينة من ١٠٠٠ شخص يعملون في مختلف المجالات، فوجد أن المتوسط الحسابي لعدد ساعات استخدام الحاسوب هو $\bar{x} = ٤,٥$ ساعة، والانحراف المعياري $\sigma = ١$ ساعة.
اختبر الفرض إذا كان متوسط عدد الساعات للمجتمع $\mu = ٥$ ، مقابل الفرض البديل $\mu \neq ٥$ عند مستوى المعنوية $\alpha = ٠,٠٥$.
- يزعم مسؤول في متجر لبيع الأدوات الكهربائية، أن متوسط الأسعار هو ٣٠٠ دينار. أخذت عينة من ٢٠ آلة فوجد أن المتوسط الحسابي $\bar{x} = ٢٨٠$ ديناراً وانحرافها المعياري $\sigma = ٣٢,٢$ ديناراً. اختبر فرضية المسؤول عند مستوى المعنوية $\alpha = ٠,٠٥$.
- في عينة من مجتمع إحصائي إذا كانت $\bar{x} = ٤٠$ ، $\sigma = ٧$ ، وحجم العينة $n = ٥٠$ ، اختبر الفرض $\mu = ٣٥$ مقابل الفرض البديل $\mu \neq ٣٥$ عند مستوى المعنوية $\alpha = ٠,٠٥$.
- المتوسط الحسابي للراتب السنوي لموظف حكومي في دولة الكويت هو ٩٦٠٠ دينار، أما المتوسط الحسابي لعينة من ٦٤ موظفًا حكوميًا في إحدى الدول الخليجية $\bar{x} = ٩٤٢٠$ ديناراً بانحراف معياري $\sigma = ٦٤٠$ ديناراً. اختبر إذا كان بالإمكان اعتبار الراتب السنوي للموظف الحكومي في هذه الدولة الخليجية هو الراتب ذاته الذي يحصل عليه الموظف الحكومي في الكويت، مستخدمًا مستوى الثقة ٩٥%.
- يزعم معلم مادة الرياضيات أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلاب في مادته هو ١٦ درجة حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة. إذا أخذت عينة من ١٠ طلاب فوجد أن المتوسط الحسابي $\bar{x} = ١٥$ درجة، والانحراف المعياري $\sigma = ١,٤$ درجة، فاخبر فرضية المعلم عند مستوى المعنوية $\alpha = ٠,٠٥$.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (١) تملك شركة عالمية فروعاً لها في عدة بلدان كبيرة. هدفها هو ربح صاف متوسطه الحسابي $\mu = 200.000$ دينار لكل فرع. عند دراسة عينة من 100 فرع، كان المتوسط الحسابي $\bar{s} = 190.000$ دينار وانحرافها المعياري $\sigma = 80.000$ دينار. تأكد من خلال الاختبار ما إذا كانت الشركة تحقق هدفها عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٢) أخذت عينة عشوائية من مجتمع إحصائي قيد الدراسة، حجمها $n = 200$ ، والمتوسط الحسابي $\bar{s} = 3.3$ ، فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 0.7$.
- اختبر الفرض $\mu = 3.5$ مقابل الفرض البديل $\mu \neq 3.5$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٣) (أ) إذا كانت قيمة $\bar{s} = 11$ ، $\sigma = 3.1$ ، $n = 10$ ، فاختر الفرض $\mu_1 = 12$ مقابل الفرض البديل $\mu_1 \neq 12$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (ب) كثر الاختبار نفسه أخذاً $n = 25$ ، σ بديل σ تساوي 1.1.
- (٤) افترض أحد خبراء التغذية أن المتوسط الحسابي لاستهلاك الشخص الواحد للحوم هو 42.1 كجم سنوياً في دول منطقة الخليج العربي. وقد أعطت عينة من 80 شخصاً من منطقة الخليج العربي أن المتوسط الحسابي لاستهلاك اللحوم السنوي للشخص الواحد هو $\bar{s} = 45.2$ كجم مع انحراف معياري $\sigma = 12$ كجم. هل قرارك سيكون رفضاً أم عدم رفض لما افترضه خبير التغذية عند استخدامك مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$ لإجراء اختبار الفرضية الإحصائي؟

(٣) المعلمة هي ثابت يصف العينة أو يصف توزيع العينة كالوسط الحسابي أو الانحراف المعياري لها.

Ⓐ Ⓐ

(٤) التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة من معالم المجتمع المجهولة.

Ⓐ Ⓐ

(٥) إذا كان توزيع المجتمع غير طبيعي و σ غير معلومة وكان حجم العينة $n < 30$ فإن المقياس الإحصائي المستخدم لقبول أو رفض العدم للمعلمة μ هو $n = \frac{(\bar{s} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

Ⓐ Ⓐ

(٦) $(\alpha - 1)$ هي معامل مستوى الثقة.

Ⓐ Ⓐ

(٧) لتعيين فترة ثقة للمعلمة μ إذا كان المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي وتباينه σ^2 غير معلوم وكان حجم العينة العشوائية $n = 16$ فإن درجة الحرية للتوزيع تساوي 15

Ⓐ Ⓐ

(٨) إذا كانت فترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع (μ) هي: $(37.644, 38.956)$ فإن $\bar{s} = 37.8$

Ⓐ Ⓐ

(٩) إذا كانت درجات الحرية هي 30 فإن حجم العينة هو 29

Ⓐ Ⓐ

(١٠) الإحصاءة هو اقران تعين قيمته من العينة كالمتوسط الحسابي \bar{s} أو الانحراف المعياري σ .

Ⓐ Ⓐ

الاختبار من متعدد

في البود (١١-٣٠) لكل بند 4 اختيارات واحد فقط منها صحيح. ظلل دائرة الرمز القابل على الاختيار الصحيح. استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٣-١١).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حجمها $n = 49$ ومتوسطها الحسابي $\bar{s} = 30$ وانحرافها المعياري $\sigma = 14$ باستخدام مستوى ثقة 95% فإن:

(١١) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ تساوي:

Ⓐ 1.69 Ⓑ 1.66 Ⓒ 1.66 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٢) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 1.96 Ⓑ 1.96 Ⓒ 1.96 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٣) فترة الثقة للمتوسط الحسابي هي:

Ⓐ (33.92, 26.08) Ⓑ (33.92, 26.08) Ⓒ (33.92, 26.08) Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٤) باستخدام المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٦-١٤).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حيث $n = 25$ ، $\bar{s} = 50$ ، $\sigma = 15$ مستوى الثقة 95% فإن:

(١٤) القيمة الحرجة هي:

Ⓐ 1.96 Ⓑ 1.96 Ⓒ 1.96 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٥) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2.074 Ⓑ 2.074 Ⓒ 2.074 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٦) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ) هي:

Ⓐ (56.192, 43.808) Ⓑ (56.192, 43.808) Ⓒ (56.192, 43.808) Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٧) أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حجمها $n = 36$ فإذا علم أن $\bar{s} = 10$ ، $\sigma = 2$ فإن عند مستوى ثقة 90% تكون القيمة الحرجة هي:

Ⓐ 1.64 Ⓑ 1.65 Ⓒ 1.65 Ⓓ ليس أي مما سبق

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٨-١٩).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حجمها $n = 100$ ومتوسطها الحسابي $\bar{s} = 40$ وانحرافها المعياري $\sigma = 10$ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة 97% تكون:

(١٨) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ هي:

Ⓐ 2.18 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٩) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2.16 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(٢٠) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة 99% تساوي:

Ⓐ 2.57 Ⓑ 2.57 Ⓒ 2.57 Ⓓ ليس أي مما سبق

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٨-١٩).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حجمها $n = 100$ ومتوسطها الحسابي $\bar{s} = 40$ وانحرافها المعياري $\sigma = 10$ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة 97% تكون:

(١٨) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ هي:

Ⓐ 2.18 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٩) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2.16 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(٢٠) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة 99% تساوي:

Ⓐ 2.57 Ⓑ 2.57 Ⓒ 2.57 Ⓓ ليس أي مما سبق

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٨-١٩).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي معياري حجمها $n = 100$ ومتوسطها الحسابي $\bar{s} = 40$ وانحرافها المعياري $\sigma = 10$ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة 97% تكون:

(١٨) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ هي:

Ⓐ 2.18 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٩) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2.16 Ⓑ 2.17 Ⓒ 2.17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(٢٠) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة 99% تساوي:

Ⓐ 2.57 Ⓑ 2.57 Ⓒ 2.57 Ⓓ ليس أي مما سبق

اختبار الوحدة الأولى

أسئلة المقال

- (١) عينة عشوائية حجمها $n = 25$ ، أخذت من مجتمع إحصائي حيث تباينة $\sigma^2 = 16$ علمًا أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{s} = 8$ أوجد فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% للمعلمة المجهولة μ .
- (٢) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 150$ فإذا كان $\bar{s} = 7.5$ وانحرافها المعياري $\sigma = 1.1$ أوجد فترة الثقة عند درجة ثقة 95% للمعلمة μ .
- (٣) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 160$ شخصًا إذا كان تباين المجتمع هو $\sigma^2 = 4$ ، والمتوسط الحسابي $\bar{s} = 9.3$ ، فأوجد فترة الثقة عند درجة ثقة 95% للمعلمة μ .
- (٤) يريد رجل افتتاح متجر خاص به في الوسط التجاري، فإذا تم أخذ عينة من المتاجر عددها 50 متجرًا، وكان المتوسط الحسابي لربح هذه المتاجر $\bar{s} = 95000$ دينار وإذا علمت أن التباين $\sigma^2 = 10000$ اختبر الفرض $\mu_1 = 100000$ مقابل الفرض البديل $\mu_1 \neq 100000$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٥) يساءل بنك الدم بفروعه المختلفة المستشفيات على تأمين كمية الدم المطلوبة للمرضى. فإذا أخذت عينة من 10 فروع، وكان المتوسط الحسابي لكمية الدم هي $\bar{s} = 20$ لترًا مع انحراف معياري $\sigma = 4$ اختبر الفرض $\mu_1 = 22$ مقابل الفرض البديل $\mu_1 \neq 22$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٦) أخذت عينة عشوائية من مجتمع قيد الدراسة حجمها $n = 35$ ، فإذا كان المتوسط الحسابي $\bar{s} = 47$ وتباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ ، اختبر الفرض $\mu_1 = 50$ مقابل الفرض البديل $\mu_1 \neq 50$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٧) (أ) في عينة عشوائية، إذا كان $\bar{s} = 40$ ، $\sigma = 3$ ، $n = 35$ ، فاختر الفرض $\mu_1 = 42$ مقابل الفرض البديل $\mu_1 \neq 42$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (ب) كثر الاختبار نفسه أخذاً $n = 25$

الصح والخطأ

في البود (١٠-١) عبارات ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و(ب) إذا كانت خاطئة.

- (١) إذا سمحت عينة عشوائية حجمها $n = 9$ من مجتمع طبيعي متباينة $\sigma^2 = 9$ وكان $\bar{s} = 97.96$ فإن فترة الثقة للمعلمة μ بمستوى ثقة 95% هي (٦، 9٩.٩٢)
- (٢) إذا كانت μ تقع في الفترة (٣٤، ٣٥٩.٢٥، ٦٤١) فإن $\mu = 30$

Ⓐ Ⓐ

Ⓑ Ⓑ

تمارين إثرائية

- (١) أخذت عينة عشوائية من مجتمع إحصائي حجمها $n = 130$ ، وكان المتوسط الحسابي $\bar{x} = 28$ ، إذا كان تباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ ، فأوجد فترة الثقة عند مستوى الثقة 95% للمعلمة المجهولة μ .
- (٢) ينتظر زبائن شركة التأمين على السيارات مدة طويلة قبل التمكن من التواصل مع مندوب خدمة الزبائن حين يتصلون ليقتدموا بشكاوى مختلفة. تعطي عينة عشوائية من 25 اتصالاً ممتلاً متوسطاً حسابياً $\bar{x} = 22$ دقيقة وانحرافاً معيارياً من 6 دقائق. أوجد فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% للمتوسط الحسابي الإحصائي μ لأوقات الانتظار.
- (٣) تم بيع عينة من 1500 منزل مؤخرًا حيث إن المتوسط الحسابي لسعر المنزل الواحد 300000 دينار. الانحراف المعياري σ معلوم وهو 70000 دينار. اختبر الفرض القائل إن متوسط الأسعار 290000 مع مستوى معنوية $\alpha = 0.05$.
- (٤) تزعم وزارة التربية أن متوسط سنوات الخبرة للمعلمين في كل المدارس هو 10 سنوات. تأكد من هذا الفرض عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ، علمًا بأن العينة من 40 معلمًا وكان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 9$ سنوات وانحراف معياري $\sigma = 4$.
- (٥) (أ) إذا كانت قيمة $\bar{x} = 143$ ، $n = 10$ ، $\sigma = 40$ ، فاختر الفرض $\mu = 150$ مقابل الفرض البديل $\mu \neq 150$ عند مستوى معنوية $\alpha = 2\%$.
- (ب) اختبر الفرض نفسه مع عينة حجمها $n = 7$ ، $\bar{x} = 8$ ، عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٦) إذا كانت الدرجة العظمى في اختبار مادة الرياضيات هي 20 درجة، فأوجد فترة ثقة عند مستوى ثقة 95% للمتوسط الحسابي μ ، بناءً على نتائج عينة من 36 طالبًا خضعوا للاختبار حيث المتوسط الحسابي للعينة هو $\bar{x} = 11.6$ وانحراف معياري $\sigma = 2.5$.
- (٧) في مجتمع الزائرين لمجمع تجاري كبير إذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 20$ دينارًا مما ينفقه كل زائر على مشترياته في الزيارة الواحدة. أوجد حجم العينة n اللازم أخذها من مجتمع الزائرين للمجمع التجاري عند مستوى ثقة 95% بحيث يكون هامش الخطأ $= 3.92$ دينار.
- (٨) يزعم مدرب فريق كرة سلة أن المتوسط الحسابي لنقاط لاعبيه هو 15 نقطة في المباراة الواحدة. إذا كان الفريق مؤلفًا من 5 لاعبين أساسيين و 10 بدلاء، والنتائج عند 5 لاعبين منهم قد أعطت القيم التالية للمتوسط الحسابي، $\bar{x} = 9$ والانحراف المعياري $\sigma = 11$ ، فاختر فرضية المذبذب عند مستوى المعنوية $\alpha = 5\%$.
- (٩) لدى مزارع أرض واسعة مزروعة بمختلف أنواع الأشجار. يقول هذا المزارع إن المتوسط الحسابي لعدد الأشجار في كل 10 أمتار مربعة هو $\mu = 4$ أشجار. أخذت عينة من 10 قطع أرض، كل واحدة مساحتها 10 أمتار مربعة، فأعطت متوسطًا حسابيًا $\bar{x} = 3.5$ أشجار وانحرافًا معياريًا $\sigma = 1.2$ ، تأكد من صحة كلام المزارع مع مستوى المعنوية $\alpha = 2\%$.

١٧

(٢١) القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 94% تساوي:

- (أ) 1.885
(ب) 1.88
(ج) 1.890
(د) 3.29

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البندين (٢٢-٢٣).

(٢٢) إذا كانت فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% لعينة أُخذت من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي المعياري هي $(17.8, 3.2)$ فإن \bar{x} :

- (أ) 21
(ب) 10.5
(ج) 19.6
(د) 0.475

(٢٣) إذا كانت فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% لعينة عشوائية أُخذت من مجتمع طبيعي معياري هي $(38, 12)$ فإن التقدير بنقطة للمعلمة المجتمع المجهولة μ يساوي:

- (أ) 12
(ب) 38
(ج) 25
(د) 50

(٢٤) أُخذت عينة حجمها $n = 9$ ، $\bar{x} = 30$ من مجتمع طبيعي معياري تباينه $\sigma^2 = 9$ فإن الحد الأدنى لفترة الثقة عند مستوى ثقة 95% هو:

- (أ) 30
(ب) $30 - 1.96 \times 2$
(ج) $30 + 1.96$
(د) $30 - 1.96$

(٢٥) أُخذت عينة عشوائية من مجتمع إحصائي حجمها $n = 30$ ، وتباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ فإذا كان الحد الأعلى لفترة الثقة عند مستوى ثقة 95% يساوي 31.96 فإن $n =$

- (أ) 16
(ب) 9
(ج) 30
(د) 15

(٢٦) من جدول التوزيع الطبيعي المعياري $N(0, 1)$:

- (أ) 2.3
(ب) 2.32
(ج) 2.31
(د) 2.33

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البندين (٢٧-٢٨).

إذا كانت $n = 16$ ، $\bar{x} = 35$ ، $\sigma = 8$ عند اختبار الفرض بأن $\mu = 30$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ، فإن المقياس الإحصائي هو:

- (أ) -0.5
(ب) -0.5
(ج) 0.5
(د) 0.5

(٢٨) منطقة القبول هي:

- (أ) $(1.96, 1.96)$
(ب) $(-2.0, 2.0)$
(ج) $(2.132, 2.132)$
(د) ليس أي مما سبق

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البندين (٢٩-٣٠).

إذا كانت $n = 16$ ، $\bar{x} = 70$ ، $\sigma = 5$ عند اختبار الفرض بأن $\mu = 72$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ فإن المقياس الإحصائي هو:

- (أ) -1.6
(ب) -1.6
(ج) 1.6
(د) 1.6

(٣٠) فترة القبول هي:

- (أ) $(1.96, 1.96)$
(ب) $(2.132, 2.132)$
(ج) $(1.6, 1.6)$
(د) $(1.703, 1.703)$

١٨